


Veterinärenkät: Vilken egenskap värderas vid val av NSAID?¹



Rangordning av de viktigaste skälen till att välja ett oralt icke-steroidalt antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID):
132 hästveterinärer gav oss sina svar.




Fyra kriterier stack ut som de främsta skälen till att välja ett NSAID:

- Enkelhet för djurägaren
- Effektivitet
- Lång verkningsduration
- Låg risk för biverkningar


De övriga föreslagna kriterierna, som nämndes mer sällan, var:

- Pris för djurägaren
- Karenstid
- Vinstmarginal för veterinären
- Maximal restsubstansgräns (MRL)


Equioxx – ett NSAID för häst




Partnern för hästveterinärer i hela Europa



Det enda läkemedelsföretaget som är **100 % dedikerat till hästars hälsa.**



Utvecklat för att stödja veterinärer i arbetet med hästens leder, matsmältning och andningsvägar.



Partnern för hästveterinärer i hela **Europa.**




Ett samlat fokus på hästens hälsa, prestation och välbefinnande – **genom hela livet.**

Vänligen kontakta din lokala representant för ytterligare information.

Linda Wallin
Affärsansvarig Audevard Sverige
☎ 073 - 621 24 03
@ linda@nordicpill.se

Johanna Rehn
Säljkoordinator - Audevard Sverige
☎ 073 - 818 19 07
@ johanna@nordicpill.se



Sources: 1. Survey conducted on 132 equine veterinarians via an online questionnaire. March 2021. 2. DOUCET M.Y., et al., Comparison of efficacy and safety of firocoxib and phenylbutazone in horses with naturally occurring osteoarthritis. JAVMA, Vol 232, 1, January 2008 3. FOGLE C. et al., Ex vivo COX-1 and COX-2 inhibition in equine blood by pheblybutazone, flunixin meglumine, meloxicam and firocoxib : informing clinical NSAID selection. Equine Veterinary Education 2020. 4. COOK V.L. et al., The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in critically ill horses. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 25(1), 2015. 5. RAIDAL S.L. et al., Pharmacokinetics and safety of oral administration of Meloxicam to foals. Journal of Veterinary Internal Medicine, 27, 300-307, 2013. 6. HOLLAND B., Pharmacokinetics and pharmacodynamics of three formulations of firocoxib in healthy horse. J Vet Pharmacol Therapy; 38, 249-256, 2014. 7. KNYCH H.K. Nonsteroidal Anti-inflammatory drug use in horses. Veterinary Clinics: Equine Practice, 33, 2017. **EQUIOXX 57 mg tuggtabletter för häst firocoxib. Sammansättning:** Firocoxib 57 mg. **Läkemedelsform:** Tuggtabletter. Bruna, runda, konvexa tabletter med brytskåra. Tabletterna är märkta på den ena sidan med "M" ovanför brytskåran och med "57" under brytskåran. **Indikationer:** Smärtlindring, inflammationshämning och reduktion av hälta i samband med osteoartrit hos häst. **Kontraindikationer:** Använd inte till djur med gastrointestinala störningar och blödningar, nedsatt lever-, hjärt- eller njurfunktion eller till djur med blödningsrubbningar. Använd inte till djur i avel, dräktiga eller lakterande djur. Använd inte samtidigt med kortikosteroider eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Använd inte vid överkänslighet mot den (de) aktiv(a) substansen (substanserna) eller mot något av hjälpämnen. **Biverkningar:** Lesioner (sår) i munslimhinnan och kring munnen var mycket vanliga hos behandlade djur i toleransstudier. Dessa lesioner var lindriga och försvann utan behandling. Salivering och läpp- och tungödem har i mindre vanliga fall associerats med lesioner i munnen i en fältstudie. **Karenstid:** Kött och slaktbiprodukter: 26 dagar. Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. **Innehavare av godkännande för försäljning:** AUDEVARD 37-39 rue de Neuilly, 92110 Clichy, Frankrike. **Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet vad gäller förskrivning:** Receptbelagt läkemedel.



Blisterförpackning med 10 tabletter

Equioxx
57mg Firocoxib

en.audevard.com - info@audevard.com - +33 1 47 56 38 26 - Laboratoires Audevard - 37-39 rue de Neuilly - 92110 Clichy - France



Lindra smärta på ett ENKELT och EFFEKTIVT sätt

Equioxx – en unik tablettbehandling för häst



Lätt att använda

1 tablett per dag ges med en liten mängd foder eller i handen tillsammans med en godbit.



Säker administrering

Behöver inte blandas i fodret – minimerar risken för att läkemedel blir kvar.



1 tablett var 24:e timme



En gång dagligen för ökad följsamhet.

Equioxx firocoxib 57 mg – ett NSAID av senaste generationen för häst.

Kliniskt bevisad smärtlindring

Jämförelse av klinisk effekt mellan firocoxib och fenylbutazon²

Studie genomförd på 253 hästar med diagnostiserad hälta i minst fyra veckor, där röntgen bekräftade förekomst av artros. Övervakning av hältans utveckling, samt relaterade symtom: smärta vid palpation, ledsvullnad och förändrad steglängd.




Likvärdig klinisk förbättring mellan fenylbutazon och firocoxib vid ortopedisk smärta.

Farmakokinetik

Firocoxibs farmakokinetik:

Firocoxibs farmakokinetiska profil möjliggör en plasmakonzentration som överstiger den nivå som krävs för att hämma 80 % av COX-2-receptorena i minst 24 timmar.



Jämförelse av EC₈₀ mellan olika NSAID för häst:

	Firocoxib 0.1mg/kg	Meloxicam 0.6mg/kg	Fenylbutazon 2.2mg/kg
Tid med plasmakonzentration över EC80	24h ⁶	9h ⁵	<8h ³

Studie på 3 hästar med en utsättningsperiod på 3 veckor mellan varje substans³. Studie på 20 hästar⁵. Studie på 6 hästar⁶.



En dos firocoxib ger en plasmakonzentration över EC80 i minst 24 timmar.

Riktad verkan på COX-2 med bevarad funktion hos COX-1


Jämförelse av COX-2-selektivitet hos antiinflammatoriska läkemedel:

En riktad verkan på cyklooxygenas-2 gör att Equioxx specifikt verkar mot smärta och inflammation, samtidigt som den fysiologiska funktionen hos cyklooxygenas-1 bevaras.

COX-1/COX-2-selektivitetsindex hos NSAID för häst

Substans	COX-1/COX-2 index* ⁴	Name ⁷
Firocoxib	265	COX-2-selektiv
Meloxicam	3.8	COX-2 preferential
Flunixin	0.336	COX-1-preferentiell
Fenylbutazon / Suxibuzon	0.302	COX-1-preferentiell

*COX-1/COX-2-index: koncentrationen av en substans som krävs för att hämma 50% av COX-1-enzymerna, dividerat med koncentrationen som krävs för att hämma 50% av COX-2-enzymerna.



Firocoxib, är ett unikt COX-2-selektivt NSAID för som bevarar COX-1:s fysiologiska funktion.