


Smärtlindring blir enkelt med

Equioxx

57mg firocoxib

Det enda icke-steroida
antiinflammatoriska
läkemedlet för häst i
tablettform.



Hej veterinärer,

Efter att ha analyserat svaren från enkäten¹ med hästveterinärer om behovet av orala NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) för häst, framkom det att fyra kriterier vägde tyngst vid valet av behandlingen:

- Enkelhet för djurägaren
- Effektivitet
- Verkningslängd
- Låg risk för biverkningar

Mot den bakgrunden är vi stolta över att presentera det första orala NSAID-preparatet i tablettform för häst: Equioxx tabletter, baserat på firocoxib – det enda COX-2-selektiva NSAID som är godkänt för häst. Equioxx är lätt att administrera tack vare tablettformen och har långvarig effekt, vilket innebär att djurägaren endast behöver ge en tablett per dag. Det förenklar följsamheten till din ordination och ger hästen varaktig lindring.



Fördelarna med Equioxx



Lätt att använda

1 tablett per dag ges med en liten mängd foder eller i handen tillsammans med en godbit.



Kliniskt bevisad effekt på smärta

Lika effektiv som fenylobutazon².



Dosering en gång om dagen

1 tablett är verksamt i 24 timmar.



Unikt COX-2-selektivt NSAID för häst

Bevarar den skyddande effekten av COX-1 på mag-tarmkanalen och njurfunktionen³.



Ladda ner teknisk specifikation
Equioxx 57mg

Kontakta gärna din lokala representant för mer information:

Linda Wallin

Affärsansvarig Audevard Sverige



073 - 621 24 03



linda@nordicpill.se

Johanna Rehn

Säljkoordinator - Audevard Sverige



073 - 818 19 07



johanna@nordicpill.se

EQUIOXX 57 mg tuggtabletter för häst firocoxib. Sammansättning: Firocoxib 57 mg. **Läkemedelsform:** Tuggtabletter. Bruna, runda, konvexa tabletter med brytskåra. Tabletterna är märkta på den ena sidan med "M" ovanför brytskåran och med "57" under brytskåran. **Indikationer:** Smärtlindring, inflammationshämning och reduktion av hälta i samband med osteoartrit hos häst. Kontraindikationer: Använd inte till djur med gastrointestinala störningar och blödningar, nedsatt lever-, hjärt- eller njurfunktion eller till djur med blödningsrubbnings. Använd inte till djur i avel, dräktiga eller lakterande djur. Använd inte samtidigt med kortikosteroider eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Använd inte vid överkänslighet mot den (de) aktiv(a) substansen (substanserna) eller mot något av hjälpämnen. **Biverkningar:** Lesioner (sår) i munslemhinnan och kring munnen var mycket vanliga hos behandlade djur i toleransstudier. Dessa lesioner var lindriga och försvann utan behandling. Salivering och läpp- och tungödem har i mindre vanliga fall associerats med lesioner i munnen i en fältstudie. **Karenstid:** Kött och slaktbiprodukter: 26 dagar. Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion. **Innehavare av godkännande för försäljning:** AUDEVARD 37-39 rue de Neuilly, 92110 Clichy, Frankrike. **Klassificering av det veterinärmedicinska läkemedlet vad gäller förskrivning:** Receptbelagt läkemedel.

Sources: 1. Survey conducted on 132 equine veterinarians via an online questionnaire. March 2021. 2. DOUCET M.Y., et al., Comparison of efficacy and safety of firocoxib and phenylbutazone in horses with naturally occurring osteoarthritis. JAVMA, Vol 232, 1, January 2008 3. ZIEGLER et al., Multicentre, blinded, randomised clinical trial comparing the use of flunixin meglumine with firocoxib in horses with small intestinal strangulating obstruction. Equine Veterinary Journal, 51, 329-335, 2018