

Dormostop Vet

atipamezolhydroklorid 5 mg/ml
injektion, lösning



Egenskaper

Dormostop Vet är en potent och selektiv $\alpha 2$ -antagonist som främjar frisättning av signalsubstansen nor-adrenalin i såväl centrala som perifera nervsystemet. Detta medför aktivering av det centrala nervsystemet på grund av sympatisk aktivitet.

Dormostop Vet kan upphäva (eller hämma) effekterna av $\alpha 2$ -agonisten, medetomidin eller dexmedetomidin.

Djurslag

Hund, katt.

Indikationer

Upphävande av de sedativa effekterna av medetomidin eller dexmedetomidin.

Dosering och administrering

Administreras IM som engångsdos 15-60 minuter efter medetomidin eller dexmedetomidin.

Hund: Dosen i mikrogram är fem gånger den föregående medetomidindosen eller tio gånger dexmedetomidindosen. Se doseringsexempel nedan:

Dos medetomidin-hydroklorid 1 mg/ml	Dos dexmedetomidin-hydroklorid 0,5 mg/ml	Dos dexmedetomidin-hydroklorid 0,1 mg/ml	Dos atipamezol-hydroklorid 5 mg/ml
40 mikrogram/kg = 0,04 ml/kg	20 mikrogram/kg = 0,04 ml/kg	20 mikrogram/kg 0,2 ml/mg	200 mikrogram/kg = 0,04 ml/kg

Katt: Dosen i mikrogram är 2½ gånger den föregående medetomidindosen eller fem gånger dexmedetomidindosen. Se doseringsexempel nedan:

Dos medetomidin-hydroklorid 1 mg/ml	Dos dexmedetomidin-hydroklorid 0,5 mg/ml	Dos dexmedetomidin-hydroklorid 0,1 mg/ml	Dos atipamezol-hydroklorid 5 mg/ml
80 mikrogram/kg = 0,08 ml/kg	40 mikrogram/kg = 0,08 ml/kg	40 mikrogram/kg 0,4 ml/mg	200 mikrogram/kg = 0,04 ml/kg

Förpackning

1 x 10 ml (Vnr 11 06 44)

Se baksidan för mer information.



Dormostop Vet

atipamezolhydroklorid 5 mg/ml
injektion, lösning

Djurslag

Hund, katt.

Indikationer

Upphävande av de sedativa effekterna av medetomidin eller dexmedetomidin.

Dos och administreringssätt

Administreras IM som engångsdos 15-60 minuter efter medetomidin eller dexmedetomidin.

Hund: Dosen i mikrogram är fem gånger den föregående medetomidindosen eller tio gånger dexmedetomidindosen.

Katt: Dosen i mikrogram är 2½ gånger den föregående medetomidindosen eller fem gånger dexmedetomidindosen.

Se doseringsexempel i produktresumén .

Överdoser

Övergående takykardi, hyperaktivitet, muskeltremor. Om nödvändigt kan dessa effekter upphävas med en (dex)medetomidinhydrokloriddos som är lägre än den kliniska dosen som vanligtvis används. Förhöjd vakenhet hos katt hanteras bäst genom att minska externa stimuli.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen/hjälpämnena. Lever- eller njursjukdomar.

Biverkningar

Hyperaktivitet, takykardi, arytmier, ökad salivavsöndring, kräkningar, okontrollerad defekation, atypisk vokalisering, muskeltremor, ökad andningsfrekvens, okontrollerad urinering, seder, hypotoni.

Interaktioner

Samtidig administrering av atipamezol och andra läkemedel med verkan på centrala nervsystemet såsom diazepam, acepromazin eller opiater rekommenderas inte.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Efter administrering bör djuren få vila på en lugn plats. Upphåller alla effekter av (dex)medetomidin, och kan leda till en övergående ökning av hjärtfrekvensen. Om andra sedativa ges, måste man hålla i åtanke att effekterna av dessa andra medel kan kvarstå efter att (dex)medetomidin har slutat verka. Upphåller inte effekten av ketamin, vilket kan orsaka krampfall/kramp hos hund och katt. Administrera inte inom 30-40 minuter efter ketamin. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Kan orsaka irritation i hud, ögon och på slemhinnor. Vid oavsiktlig exponering av hud och ögon, skölj med vatten. Om irritation kvarstår, uppsök läkare och visa bipacksedeln. Kan orsaka adrenerga effekter. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln.

Dräktighet och laktation

Rekommenderas inte under dräktighet och laktation.

Hållbarhet

Öppnad: 30 månader. Öppnad: 28 dagar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga.

Förpackningsstorlek:

1 x 10 ml

ATC-kod:

QC01CE90

Innehavare av godkännande för försäljning

Alfasan Nederland B.V.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.

11.2025/SE
20230817