


Robexera vet

robenakoksib 5, 10, 20, 40 mg
tyggetabletter



- Velkjent og velprøvd COX-2 selektiv substans
- Substans med høy sikkerhetsmargin⁴
- Behandler både smerte og betennelse⁴
- Konsentreres i betent vev³
- Enkel dosering
- Konkurransedyktig pris

salfarm
www.salfarm.com

Optimer smertebehandlingen din med Robexera vet.



Robenakoksibs korte halveringstid i blodbanen og høye vevsselektivitet gjør at det, som en svak syre, binder seg til inflammasjonsstedet og elimineres raskt fra blodomløpet. Dette skåner godt perfunderte organer, som lever, nyrer og mage-tarmkanal^{1,2}



Måltrettet dit det gjør vondt – Robenakoksib når toppkonsentrasjon og forblir lengre ved inflammasjonsstedet enn i blodet, på grunn av selektiv distribusjon til inflammatorisk eksudat^{1,3}



Robenakoksib forblir ved inflammasjonsstedet og gir effektiv smertelindring i opptil 24 timer⁴



Enkel å administrere – liten, smakstilsatt tablett som gis uten mat⁵

Artrose

1-2 mg/kg daglig, se tabellen nedenfor.

Kroppsvekt (kg)	Antall tabletter etter styrke			
	5 mg	10 mg	20 mg	40 mg
2,5 til < 5	1 tablett			
5 til < 10		1 tablett		
10 til < 20			1 tablett	
20 til < 40				1 tablett
40 til 80				2 tabletter

Bløtvevskirurgi

2-4 mg/kg daglig i opptil 3 dager, se tabellen nedenfor.

Kroppsvekt (kg)	Antall tabletter etter styrke			
	5 mg	10 mg	20 mg	40 mg
2,5	1 tablett			
> 2,5 til < 5		1 tablett		
5 til < 10			1 tablett	
10 til < 20				1 tablett
20 til < 40				2 tabletter
40 til < 60				3 tabletter
60 til 80				4 tabletter

Indikasjoner: Behandling av smerter og inflammasjon ved kronisk osteoartritt. Behandling av smerter og inflammasjon ved bløddelskirurgi. **Dosering og tilførselsvei:** 1 mg/kg med et intervall på 1-2 mg/kg. Gis 1 gang daglig på samme tid hver dag. Se forsiden for doseringstabell. **Overdosering/Forgiftning:** Hos friske hunder i alderen 5-6 måneder ga store overdoser robenakoksib gitt oralt ingen tegn på toksisitet, heller ikke i form av gastrointestinale, nyre- eller levertoksitet og ingen effekt på blødningstid. Robenakoksib hadde heller ingen skadelig effekt på brusk eller ledd. Som med alle NSAIDs, kan overdosering forårsake gastrointestinale, nyre- eller levertoksitet i sensitive eller generelt svekkede hunder. Det finnes ingen spesifikk motgift, men symptomatisk, støttende behandling anbefales. Bruk av robenakoksib tabletter hos blandingshunder med overdoser på opptil 3 ganger den høyeste anbefalte dosen resulterte i betennelse, opphopning av blod og blødning i tolvfingertarmen, jejunum og blindtarmen. Man så ingen signifikante effekter på kroppsvekt, blødningstid eller tegn på nyre- eller levertoksitet. **Kontraindikasjoner:** Må ikke brukes til hunder som lider av mage/tarmsår eller med leversykdom. Må ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre NSAIDs. Må ikke brukes ved overfølsomhet. Må ikke brukes til drektige eller diegivende dyr. **Bivirkninger:** Gastrointestinale bivirkninger, oppkast, anoreksi, apati, løs avføring, nedsatt appetitt, diaré, forhøyede leverenzymmer, blod i avføringen, sløvheter. **Interaksjoner:** Skal ikke gis sammen med andre NSAIDs eller glukokortikosteroider. Om dyret står på slike bør det være en behandlingsfri periode på minst 24 timer før du starter behandling med robenakoksib. Samtidig behandling med legemidler som påvirker nyrestrømmen, f.eks. diuretika eller ACE-hemmere, bør følges av kliniske kontroller. Unngå å gi potensielt nefrotoksiske legemidler samtidig. Samtidig bruk av andre virkestoffer med høy grad av proteinbinding kan konkurrere om binding og dermed gi toksiske effekter. **Spesielle advarsler og særlige forholdsregler:** Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr: Sikkerhet er ikke fastslått for hunder som er < 2,5 kg eller yngre enn 3 måneder. Ved langvarig behandling bør leverenzymmer sjekkes ved oppstart og under behandlingen. Behandlingen bør seponeres hvis leverenzymaktivitet øker betydelig eller hvis hunden viser samtidige kliniske tegn som anoreksi, oppkast eller apati. Bruk til hunder med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon, eller til hunder som er dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive kan utgjøre en risiko. På bruk til hunder med risiko for magesår, eller til hunder som tidligere har vist intoleranse mot andre NSAIDs, kreves tett oppfølging av veterinær. Tablettenes smakstilsatt. Hold tablettenes utgjengelighet for dyr for å unngå utilsiktede inntak. **Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet:** For gravide, spesielt de nær termin øker langvarig hudeksponering risikoen for prematur lukking av ductus arteriosus hos fosteret. Gravide kvinner bør utvise spesiell forsiktighet. Utilsikket inntak øker risikoen for NSAID-bivirkninger, spesielt hos små barn. Forsiktighet bør utvises for å unngå utilsikket inntak hos barn. For å hindre at barn får tak i produktet, bør tablettenes utgjengelighet fjernes fra blisleret før den er klar til å gis til dyret. Tablettenes skal administreres og lagres (i originalemballasjen) utilgjengelig for barn. Ved utilsikket svelging, kontakt lege umiddelbart og vis pakningsvedlegg/etikett. Vask hendene etter bruk. **Drektighet/Laktasjon:** Skal ikke brukes under drektighet og diegiving. Sikkerhet er ikke klarlagt. Skal ikke brukes til avlsdyr. **Oppbevaring og holdbarhet:** I uåpnet pakke: 2 år. Oppbevares ved høyest 30 °C og i original pakning for å beskytte mot fuktighet. **Pakningsstørrelse:** 3 x 10 tabletter. **Reseptgruppe:** C ATCvet-nr.: QM01A H91 **Innehaver av markedsføringen tilatelsen:** Krka, d.d., Novo mesto

Teksten er forkortet i forhold til preparatomtalen godkjent av Legemiddelverket. Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra: Salfarm Scandinavia AS, Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo. Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com

Kilder:

- Kongara K, and John PC. "Robenacoxib in the treatment of pain in cats and dogs: safety, efficacy, and place in therapy." Veterinary medicine (Auckland, N.Z.) vol. 9 53-61. 15 Aug. 2018. doi:10.2147/VMRR.S170893.
- Silber HE, Burgener C, Letellier IM, et al (2010). Population pharmacokinetic analysis of blood and joint synovial fluid concentrations of robenacoxib from healthy dogs and dogs with osteoarthritis. Pharm Res (2010): 27:2633-45. doi: 10.1007/s11095-010-0262-z.
- Lees, P, Toutain PL, Elliott, J, Giraudel, JM, Pelligand L, King JN. (2022). Pharmacology, safety, efficacy and clinical uses of the COX-2 inhibitor robenacoxib. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 45, 325-51. <https://doi.org/10.1111/jvp.13052>.
- Pascoe J. Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats (Second Edition). Anesthesia and pain management (2020) 22-43.e1. doi: 10.1016/B978-0-7020-7675-6.00013-9.
- Robexera vet SmPC.