

Trichoderm Vet.

Levende *Trichophyton verrucosum* stamme Bodin 1902

– min. $3,125 \times 10^6$ CFU, max. $18,75 \times 10^6$ CFU pr. ml.

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension



Egenskaber

Vaccine mod ringorm – *Trichophyton verrucosum*.

Vaccinen kan bruges profylaktisk og terapeutisk.

Vaccination med bredt aldersspænd:

Kan gives til helt unge kalve (en dag) og helt op til voksne dyr.

Immunitet varer mindst 5 år.

Vaccinen kan anvendes under drægtighed.

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Til aktiv immunisering mod ringorm – *Trichophyton verrucosum*.

Indtræden af immunitet: 1 måned efter revaccination.

Varighed af immunitet: Varer mindst 5 år.

Dosering/indgivelse

Administrationsmåde:

Udelukkende til dyb intramuskulær administration. Vaccination og revaccination bør udføres i henholdsvis venstre og højre side af halsen.

Dosering:

Profylaktisk og terapeutisk:

- Kalve i alderen en dag op til tre måneder: 2x2ml med 5-14 dages mellemrum.

- Kvæg ældre end tre måneder: 2x4ml med 5-14 dages mellemrum.

En tredje revaccination kan administreres 2-4 uger efter revaccinationen til dyr, der er svært ramt af trichofytiske forandringer.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 14 dage.

Pakningsstørrelse

Vnr 505681 - 1 x 40ml

Vnr 534227 - 5 x 10ml

Se bagsiden for mere information.



salfarm
www.salfarm.com

Vaccine

Trichoderm Vet.

Levende *Trichophyton verrucosum* stamme Bodin 1902
– min. 3,125 x 10⁶ CFU, max. 18,75 x 10⁶ CFU pr. ml.
Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension

Dyrearter

Kvæg.

Indikation

Til aktiv immunisering mod bovin trichophytose forårsaget af *Trichophyton verrucosum*.

Indtræden af immunitet: 1 måned efter revaccination.

Varighed af immunitet: Varer mindst 5 år.

Dosering

Administrationsmåde:

Udelukkende til dyb intramuskulær administration. Vaccination og revaccination bør udføres i henholdsvis venstre og højre side af halsen.

Dosering:

Profylaktisk og terapeutisk:

- Kalve i alderen en dag op til tre måneder: 2x2 ml.

- Kvæg ældre end tre måneder: 2x4 ml.

Intervaller mellem vaccination og revaccination bør være 5-14 dage.

En tredje revaccination kan administreres 2-4 uger efter revaccinationen til dyr, der er svært ramt af trichofytiske forandringer.

Overdosering

Ved administration af en ti-dobbelt vaccinedosis opstod der lokale reaktioner i form af en skorpe på huden ved injektionsstedet samt en let stigning i legemstemperaturen.

Kontraindikationer

Vaccinerede dyr må ikke holdes sammen med andre kvæg, der er inficeret med trichophytose.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bivirkninger

Sjældent (1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):	Absces på injektionsstedet ¹
Meget sjældent (< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):	Anafylaktoid reaktion ² Skorpe på injektionsstedet ³
Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):	Forhøjet legemstemperatur

¹ Op til 20 cm i diameter, hvis ikke administreret dybt intramuskulært (i meget sjældne tilfælde).

² I tilfælde af hypersensitivitets-/anafylaktoid reaktioner (normalt inden for to timer efter vaccination), bør symptomatisk behandling straks iværksættes.

³ En tynd overfladeskorpe på 10 mm-20 mm i diameter, som falder af spontant inden for 2-4 uger, kan opstå på applikationsstedet 10-14 dage efter vaccinationen.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Interaktion

Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler, undtagen solvens, der leveres til brug med dette veterinærlægemiddel.

Parenteral eller oral behandling med antimykotiske præparater bør ikke udføres samtidig med vaccinationen.

Andre immunprofylaktiske indgreb er kontraindiceret i perioden fra 10 dage før den første vaccination til 20 dage efter den anden (tredje) vaccination.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning af vaccinen ved samtidig brug med andre veterinærlægemidler end dem, der er nævnt ovenfor. En beslutning om at anvende vaccinen før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Lyofilisat skal opløses med den vedlagte Solvens A inden brug.

Vaccinen skal anvendes senest to timer efter opblanding.

Kun raske dyr må vaccineres (undtagen i tilfælde af trichofytske læsioner, hvor en tredje dosis kan være nødvendig for at sikre tilstrækkelig beskyttelse).

Den bedst mulige effekt opnås, hvis der – ud over vaccination – foretages grundig rengøring og desinfektion af stalde og inventar for at inaktiverer ringormsporer i miljøet.

Særlige forholdsregler vedrørende brugen

Særlige forholdsregler vedrørende sikker brug hos de dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Det anbefales at administrere produktet i et område med tilstrækkelig muskelmasse, især hos unge dyr.

Latent sygdom kan fremprovokeres, når dyr, der befinder sig i inkubationsfasen af sygdommen vaccineres. Deres kliniske tilstand kan midlertidigt forværres, men de trichofytske forandringer, der er synlige på huden, vil gradvist forsvinde.

Alle dyr i besætningen skal vaccineres. Nyindførte kalve eller nyindkøbte dyr skal også vaccineres, da sporer af *Trichophyton verrucosum* er meget resistente og kan overleve i dyrenes omgivelser i 6-8 år.

Kun raske dyr må vaccineres.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer veterinærlægemidlet til dyr

Dette veterinærlægemiddel indeholder levende mikroorganismer og udgør en potentiel infektionsrisiko. Undgå hudkontakt med veterinærlægemidlet. Personligt beskyttelsesudstyr i form af gummihandsker bør anvendes ved håndtering af veterinærlægemidlet. Ved hudkontakt skylles grundigt med vand. Ved kontakt med øjnene skylles med fysiologisk saltvandsopløsning.

Det tilrådes, at personer med svækket immunforsvar undgår kontakt med vaccinen.

Særlige forholdsregler vedrørende beskyttelse af miljøet

Ikke relevant.

Drægtighed og laktation

Kan anvendes under drægtighed.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 14 dage.

Opbevaring og opbevaringstid

Opbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C).

Beskyttes mod frost. Beskyttes mod lys.

Opbevaringstid efter opløsning: 2 timer.

Pakningsstørrelse:

Varenr. 505681: Kartonæske indeholdende 1 flaske med lyofilisat og 1 flaske med 40 ml Solvens A.

Varenr. 534227: Plastikæske indeholdende 5 flasker med lyofilisat og 5 flasker med 10 ml Solvens A.

Udleveringsgruppe: BP

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bioveta a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané 683 23, Tjekkiet.

Fuldstændigt produktresumé kan ses på www.produktresume.dk eller rekvireres hos: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, Tlf.: 75 50 80 80, Email: info@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.