


Clindabactin

Clindamycin

Doseringssskema

Styrker



- ▶ Alle tre styrker i smarttabs, **deles let i to eller fire lige store dele**
- ▶ Godkendt til både hund og kat
- ▶ Høj compliance med **smagskorrigerede tyggetabletter**



Dechra Veterinary Products A/S Tlf. 76 90 11 00
 technical.nordic@dechra.com Juli 2021

Nedenstående doseringsskema er lavet ud fra en dagsdosis af Clindabactin på 11 mg/kg en gang dagligt. Clindabactin kan også gives i en dosis på 5,5 mg/kg to gange dagligt.

For yderligere information, se venligst bagsiden.

Clindabactin 55 mg. 1 tablet pr 5 kg lgv.	
Hundens/Kattens vægt	Daglig dosis
1,25 kg*	
2,5 kg*	
3,75 kg*	
5 kg	
7,5 kg*	
10 kg	

Clindabactin 220 mg. 1 tablet pr 20 kg lgv.	
Hundens/Kattens vægt	Daglig dosis
10 kg*	
15 kg*	
20 kg*	

Clindabactin 440 mg. 1 tablet pr 40 kg lgv.	
Hundens/Kattens vægt	Daglig dosis
20 kg*	
30 kg*	
40 kg*	

* Delte tabletter kan holde sig i 3 dage.



Clindabactin. Aktivt stof: Clindamycin. **Dyrearter:** 55 mg hunde og katte, 220 mg 440 mg hunde. Rx.
ATCvet-kode: QJ 01 FF 01. **Terapeutiske indikationer:** Hunde. Til behandling af betændte sår og bylder, og infektioner i mundhulen, herunder parodontose, forårsaget af eller forbundet med *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* (undtagen *Streptococcus faecalis*), *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum* og *Clostridium perfringens*, som er følsomme over for clindamycin. Til behandling af overfladisk pyoderma forbundet med *Staphylococcus pseudintermedius*, følsom over for clindamycin. Til behandling af osteomyelitis, forårsaget af *Staphylococcus aureus*, følsom over for clindamycin. Katte: Til behandling af betændte sår og bylder, og infektioner i mundhulen, herunder parodontose, forårsaget af bakterier, der er følsomme over for clindamycin. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, hamstre, marsvin, chinchillas, heste og drøvtyggere, da indtagelsen af clindamycin af disse arter kan forårsage svære mave-tarm-problemer, der kan føre til dødelig

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Tøjetabletterne skal tablettures opbevares utilgængeligt for hvalp. Brugen af dette præparat skal baseres på følsomhedstesting af bakterier, som isoleres fra dyret. Hvis dette ikke er muligt, skal behandlingen baseres på lokal epidemiologisk information om følsomheden af målpatogener. Officielle, nationale og regionale retningslinjer for anvendelse af antimikrobielle præparater bør tages i betragtning når veterinærlægemidlet anvendes. En anvendelse af dette præparat der afviger fra anvisningerne i produktets retningslinjer skal overvejes omhyggeligt. **Interaktioner:** Over for clindamycin, og det kan nedsætte virkningen af behandling med lincocain eller makrolid-antibakterielle midler, på grund af muligheden for krydsreaktion. Der blev vist krydsreaktion blandt lincosamidpræparater tilfælde (clindamycin og andre makrolider). Indtagelse af de fleste lever- og nyrefunktionsstoffer, for at indgå et behandlingsforløb. Blev overfladisk pyoderma blev behandlet topisk. Blev over for og valgt inden af

systemisk antimikrobiel behandling skal baseres på en nøje overvejelse af det enkelte tilfælde. Ved langvarig behandling på en måned eller længere, skal der udføres periodiske lever- og nyrefunktions tests og blodbilder. Dyr med svære nyre- og/eller meget svære leverforstyrrelser forbundet med svære metaboliske afvigelser skal doseres med forsigtighed, og de skal overvåges med undersøgelse af serum under højdosering clindamycinbehandling. Brugen af præparatet anbefales ikke hos neonatere. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Lincosamider (lincocain, clindamycin, priframycin) kan forårsage overfølsomhedsreaktioner (allergi). Ved overfølsomhed over for lincosamider, bør kontakt med lægemidlet undgås. Vask hænder efter håndtering af tablettures. Indtagelse ved hændligt uheld kan føre til mave-tarm-påvirkninger, såsom opblåthed og indtagelse ved hændligt uheld. For at nedsætte risikoen for børns indtagelse ved hændligt uheld, bør tabletture ikke tages ud af blisterkorset, før man er klar til at administrere det til dyret. Sæt delvist brugte tabletter tilbage i blisterkorset og karromen, og brug dem ved den efterfølgende administration. I tilfælde af indgift ved hændligt uheld, skal der bærns straks søges lægehjælp, og indlæggelsen eller etiketten skal vises til lægen. **Bivirkninger:** Opkastning og diarré er blevet observeret med en ikke almindelig hyppighed. Clindamycin forårsager ikke almindelig overvægt af ikke-følsomme organismer, såsom resistente clostridia og gær. I tilfælde af superfunktion skal der tages passende forholdsregler i henhold til den kliniske situation. **Drægtighed eller dyngning:** Selvom højdosistudier hos rotter tyder på, at clindamycin ikke er teratogent, og ikke påvirker reproduktionsvejen hos hanner og hunner, er sikkerheden hos hundehunde/hunkatte eller hos hanhunde/hankatte,

som er avlsdyr ikke blevet klarlagt. Clindamycin krydser placenta og skilles fra blodet i mælken. Behandling af dyngende hanner kan forårsage diarré hos hvalpe og killinger. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk forholdet. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Clindamycinhydrochlorid har vist sig at have neuromuskulære blokerende egenskaber, der kan forstærke virkningen af andre neuromuskulære blokerende stoffer. Præparatet skal anvendes med forsigtighed hos dyr, der får sådanne stoffer. Aluminiumsulfat og hydroxider, kaolin og aluminium-magnesium-silikatkompleks kan reducere absorptionen af lincosamider. Disse fordelelssstoffer bør administreres mindst 2 timer før clindamycin. Clindamycin bør ikke bruges samtidigt med eller umiddelbart efter erythromycin eller andre makrolider, for at forhindre makrolid-induceret resistans over for clindamycin. Clindamycin kan reducere plasmaniveauerne af ciclosporin, med en risiko for manglende aktivitet. Under den samtidige brug af clindamycin og aminoglykosider (f.eks. gentamicin), kan risikoen for uønskede interaktioner (aktu nyresigt) ikke udelukkes. Clindamycin bør ikke bruges samtidigt med chloramphenicol eller makrolider, da de antagoniserer hinanden på deres virkningssted på den 50S ribosomale delenhed.

Dosering og indgivelsesmåde: Oral anvendelse.

1. Til behandling af betændte sår og bylder, og infektioner i mundhulen, herunder parodontose hos hunde og katte, skal der enten administreres:

- 5,5 mg/kg legemsvægt hver 12. time i 7-10 dage, eller
- 11 mg/kg legemsvægt hver 24. time i 7-10 dage.

Hvis der ikke observeres noget klinisk respons inden for 4 dage, skal diagnosen bestemmes igen.

2. Til behandling af overfladisk pyoderma hos hunde skal der enten administreres:

- 5,5 mg/kg legemsvægt hver 12. time, eller
- 11 mg/kg legemsvægt hver 24. time

Behandlingen af overfladisk pyoderma hos hunde anbefales normalt i 21 dage, med en kortere eller længere behandling baseret på den kliniske bedømmelse.

3. Til behandling af osteomyelitis hos hunde skal der administreres:

- 11 mg/kg legemsvægt hver 12. time i mindst 28 dage.

Hvis der ikke observeres noget klinisk respons i løbet af 14 dage, skal behandlingen stoppes og diagnosen skal bestemmes igen.

For at sikre en korrekt dosering, skal legemsvægten bestemmes så akkurat som mulig for at undgå overdosering.

Indehaver af markedsforsigtighedsregler: Dechra Regulatory B.V. Repræsentant: Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 26. januar 2021. **Udleveringsbestemelse:** B. **Overstanset tekst er forkortet resume af sammendraget af produktets databaser. For yderligere information se venligst på www.medicintilvir.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.**