



## Doseringsskema

**Styrker**

- 15mg
- 50mg
- 150mg

Til små hunde  
og katte helt  
ned til 1,5kg



- Delekærve, nemme at dele
- Tabletter med smag, nemme at give
- Blister pakning,  
nemme at administrere
- Alle styrker i 10 stk. pakninger



Floxabactin 15mg. 1 tablet pr 3 kg lgv.

Hundens/Kattens vægt	Daglig enkeltdosis
1,5 kg*	
3,0 kg	
4,5 kg*	
6 kg	

Floxabactin 50mg. 1 tablet pr 10 kg lgv.

Hundens vægt	Daglig enkeltdosis
5 kg*	
10 kg	
15 kg*	
20 kg	

Floxabactin 150mg. 1 tablet pr. 30 kg lgv.

Hundens vægt	Daglig enkeltdosis
15 kg*	
30 kg	
45 kg*	
60 kg	

\* Delte tabletter kan holde sig i 24 timer

# FLOXABACTIN® VET. ENROFLOXACIN

## FLOXABACTIN VET. ENROFLOXACIN.

**Præsentation:** Tabletter indeholdende enrofloxacin til oral anvendelse.

**Virkningsmekanismer/egenskaber:** Enrofloxacin er et syntetisk antibiotikum af gruppen fluorquinoloner, som virker gennem inhibition af enzymet topoisomerase II, der er involveret i bakteriens replikationsmekanisme. Virkningen er koncentrationstængig. Enrofloxacin virker på bakterier i vækst. Enrofloxacin udøver aktivitet mod de fleste gram-negative bakterier, særligt mod Enterobakterier, E. Coli, Klebsiella, Proteus og Enterobacter. Pseudomonas aeruginosa er variabelt modtagelig og når den er modtagelig, har den typisk et højere MIC end andre modtagelige organisme. Staphylococcus aureus og Staphylococcus intermedius er normalt modtagelige. Streptokocker, Enterokocker og anaerobe bakterier kan generelt anses for resistente. Biotigængeligheden for enrofloxacin er ca. 100% efter oral administrasjon. Optagelsen påvirkes ikke af føde. Enrofloxacin udskilles primært gennem nyrene. Enrofloxacin baserer blod-hjernebarrieren. Halveringstiden er på ca. 3-08-6,8 timer for hundehorsys hunde og katte. Ca. 25% af den indgivne dosis af enrofloxacin udskilles i urinen og 75% i ræves. **Indikationer:** Hos katte: Behandling af infektioner i øjen og luftrøye. Hos hunde: Behandling af infektioner i den nedre urinvej (med og uden forbundelse til prostatitis) og infektioner i den øvre urinvej (forårsaget af *Escherichia coli* eller *Proteus mirabilis*). Behandling af overfladisk og dyb pyoderma. **Bivirkninger:** Hypepersensitive reaktioner: Ændringer i centralnervesystemet i katte. Okastning eller diarræ kan lejlighedsvis forekomme under behandlingen. Disse tegn milites spontant og kræver i almindelighed ikke, at behandlingen afbrydes. Hunde: Mulige forandringer af ledrusik hos hvalpe i vækst. Isædte tilfælde opkastning og anoreksi observeret. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes til hunde, som er under 12 måneder (små racer) eller under 18 måneder (store racer), da midlet kan forårsage forandringer af epifysen hos hvalpe i vækst. Bør ikke anvendes til unge katte i vækst, på grund af risikoen for at beskadige ledbrusk. (Katte som er under 3 måneder eller vejer mindre end 1 kg). Bør ikke anvendes i hunde eller katte med risiko for krampelegnende anfall, da enrofloxacin kan stimulere CNS. Bør ikke anvendes i hunde eller katte med kendt overførsomhed for fluorquinoloner eller til nogen af hjælpstofferne i lægemidlet. Bør ikke anvendes i tilfælde, hvor resistens overfor quinoloner er konstateret, da der en næsten komplet krydsresistens overfor andre quinoloner og komplet

krydsresistens overfor andre fluorquinoloner. Bør ikke anvendes ikke i forbundelse med tetracycliner, phenikoler eller makrolider da der kan være antagonistiske effekter. **Interaktioner:** Samtidig brug af flunixin bor forega under overvægning af dyrlæge, da interaktion mellem disse stoffer kan medføre bivirkninger som føge af forsinket elimination. Ved samtidig brug af theophyllin kræves nogen overvægning af blodbildet, da theophyllin niveauer i blodserummet kan øges. Samtidig brug af præparater indeholdende magnesium eller aluminium (såsom artacida eller sukratid) kan reducereabsorptionen af enrofloxacin. Disse præparater bør administreres 2 timer før/etter Floxabactin Vet. Bør ikke anvendes ikke i forbundelse med tetracycliner, phenikoler eller makrolider, da der kan være antagonistiske effekter. Bør ikke anvendes samtidig med ikke-steroidale antiinflammatoriske lægemidler, da dette kan fremkalde krampesanfalder. **Draagtighed og døgesgivning:** Draagtighed: Bør kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlig dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Døgesgivning: Kontraindiceret at bruge under døgesgivning. **Cave:** Den anbefalte dosis bør ikke overskrides. Ved overdosering af kat kan der opstå retinotoxiske virkninger hos katten, som kan medføre irreversibel blindhed. **Dosering og brugesvej:** Hunde: 5 mg enrofloxacin/kg/døgn som daglig enkeltdosis, dvs. en tablet pr. 3 kg dægligt i: 10 dage ved infektioner i den nedre urinvej. 15 dage ved infektioner i den øvre urinvej og infektioner i den nedre urinvej forbundet med prostatitis. Op til 21 dage ved overfladisk pyoderma afhængigt af den kliniske respons. Op til 49 dage ved dybt pyoderma afhængigt af den kliniske respons. Katte: 5 mg enrofloxacin/kg/legemsvegt en gang daglig i 15-10 døgn hinanden følgende dage: enten 1 tablet pr. 3 kg legemsvegt som daglig enkeltdosis. Eller ½ tablet pr. 1,5 kg legemsvegt som daglig enkeltdosis. Behandlingen bør genovervejes, såfremt ingen bedring ses halvejs i behandlingsperioden. Tabletteerne kan gives direkte i hundens eller katteens mund eller sammen med føder, hvis dette er nødvendigt. **Holdbarhed:** I salgsprækning, 3 år. Holdbarhed af dette tabletter: 24 timer. **Pakning og pris:** Floxabactin 15mg, 10 stk til hund og kat. Floxabactin 50mg, 10 stk til hund. Floxabactin 150mg, 10 stk til hund. Dagaktuelle priser kan ses på [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk). **Indehaver af markedsføringsstilladelse:** Dechra Veterinary Products A/S. Det fulde produktresume kan rekvireres vederafslit hos Dechra.