

Lidcosal Vet

En spray som forenkler intubering.

Det kan være udfordrende at intubere katte. De har et følsomt strubehoved som let kan krampe i de såkaldte laryngospasmer. Dette gør intuberingen sværere og kan medføre luftvejsobstruktion.

Lidcosal Vet er en topikal laryngopharyngeal spray som indeholder lidokain. Det aftagbare og desinficerbare mundstykke på sprayer sikrer at en præcis dosis lidokain administreres hver gang.



Lidcosal Vet forenkler endotrakeal intubering

- Lokalbedøver slimhinden i svælget.
- Modvirker larynxrefleksen og reducerer risikoen for laryngospasmer.
- Muliggør dosering af en præcis og passende mængde lidokain.

Udviklet til katte


- Spraymundstykket er tilpasset katte.
- Hvert spray indeholder en dosis på 2,3mg lidokain, hvilket gør det let at beregne den totale mængde lidokain katten har fået, også når den har fået eventuelle andre lokalbedøvelser i samme procedure.
- Doser 1-2 spray i svælget forud for intubering.
- Vent 30-90 sekunder på ønsket effekt før intubering påbegyndes.

Praktisk pakningsstørrelse

- Flaske på 10 ml
- Aftagbart spraymundstykke for enkel rengøring.
- Giver en præcis dosis lidokain i form af en tynd spraytåge.
- Flasken indeholder ca. 72 spray.
- Pakningen er holdbar i 3 måneder efter første anbrud.

For mere information omkring produktet, samt tips og gode råd om intubering fra Dr Alex Dugdale MA VetMB PhD DipECVAA PGCert (LTHE) FHEA MRCVS:

www.dechra.dk/campaigns/lidcosal



Lidcosal vet®

En spray, det gør intubering af katte lettere

Det kan være vanskeligt at intubere katte på grund af deres størrelse, anatomi og følsomme svælg. Intubering er nødvendig for at sikre frie luftveje og for at mindske kontamineringen af omgivelserne med anæstesigas.

Katte har et følsomt strubehoved som let krampes i såkaldte larynxspasmer, hvilket gør intubering vanskeligere og kan forårsage luftvejsobstruktion. Ved brug af **Lidcosal vet**, som er en topikal spray til lokalbedøvelse, før intubering, hæmmes larynxrefleks og risikoen for larynxspasmer mindskes.

Lidcosal vet

Spraydysen på Lidcosal vet har en udformning, som er designet specielt til brug hos katte. Spraydysen giver en nøjagtig lidokaindosis, som en sprøjteåge i svælg, hvilket mindsker risikoen for at udløse larynxrefleks i forhold til anvendelse af en væske på slimhinden. Dysen er aftagelig og er let at rengøre mellem patienterne.



Lidcosal Vet. 16,2 mg/ml. Laryngofaryngealspray, opløsning. Klar, farveløs væske. Rx. **Aktivt stof:** Lidocain. **Dyreart:** Kat. **Indikation:** Lokalbedøvelse af larynxslimhinden hos katte for at lette endotrakeal intubation ved at forhindre stimulering af larynxrefleks. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til dyr, der er hypovolæmiske eller udviser hjerteblok. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. **Bivirkninger og risici:** Ingen kendte bivirkninger. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Skal anvendes med forsigtighed i tilfælde af nedsat leverfunktion og/eller hjerteinsufficiens. Det anbefales at kuldesterilisere dysen mellem hver brug for at undgå spredning af infektion. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Lidocain og chlorocresol kan forårsage (allergiske) overfølsomhedsreaktioner. Utilsigtet eksponering over for dette produkt kan medføre lokale virkninger, såsom følelsesløshed og systemiske virkninger, såsom svimmelhed eller dødsghed. Brug handsker ved håndtering af produktet og vask eventuelle eksponerede områder efter brug. Lidocain kan danne genotoksiske og mutagene metabolitter hos mennesker. Disse metabolitter kan også medføre,

i langvarige toksikologiske studier af rotter, kræftfremkaldende virkninger ved høje doser. **Interaktion med andre lægemidler:** Ingen kendte. **Dosering:** Til laryngofaryngeal anvendelse. Spray en eller to gange bagerst i svælg. For brug skal pumpen primes, indtil væske frigives. Det anbefales at spraye minimum 4 gange for at klargøre flasken inden første brug, og mindst 2 gange for at klargøre igen, hvis den ikke har været brugt i 7 dage eller længere. Hvert pust (ca. 0,14 ml) indeholder ca. 2,8 mg lidocainhydrochloridmonohydrat, hvilket svarer til 2,27 mg lidocain. Vent 30-90 sekunder før intubation, så strubehovedet er afslappet. Bemærk, at aktuatoren skal tages lodret ud af sprøjtepumpen og ikke skråt for at sikre, at stiften ikke bliver beskadiget. **Pakningsstørrelser og pris:** 10 ml hætteglas med sprøjtepumpe og aktuator. Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk. **Udleveringsgruppe:** B. **Dato for ændring af teksten:** 26. august 2019. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B.V. **Lokal repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af produktresuméet. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk.**