


















# Noroclav Vet. Amoxicillin+clavulansyre



Alle styrker  
fås som enkelt- og  
multipakning. Multi-  
pakning må deles  
til udlevering.

## DOSERINGSVEJLEDNING:

12,5 mg (10 mg amoxicillin + 2,5 mg clavulansyre) pr. kg legemsvægt 2 gange dagligt.

 Noroclav Vet 40 mg +10 mg		 Noroclav Vet 200 mg + 50 mg		 Noroclav Vet 400 mg + 100 mg	
KROPSVÆGT I KILO	ANTAL TABLETTER PR. DOSERING	KROPSVÆGT I KILO	ANTAL TABLETTER PR. DOSERING	KROPSVÆGT I KILO	ANTAL TABLETTER PR. DOSERING
1-2		10		20	
3-4		19-20		40	
5-6		21-30		60	
7-8		31-40		80	
9-10		41-50			

# Noroclav vet

## Amoxicillin/Clavulansyre



### Præsentation:

Kombinationspræparat fra penicillingruppen til oral anvendelse

### Virkningsmekanismer/egenskaber:

Amoxicillin er et  $\beta$ -lactamantibiotikum hvis struktur indeholder  $\beta$ -lac-tam- og thiazolidinring i lighed med øvrige penicilliner. Amoxicillin har en god effekt overfor følsomme Gram-positive og Gram-negative bakterier.

Clavulansyre er en  $\beta$ -lactamasehæmmer. Clavulansyre trænger gennem bakteriecellevæggen og binder sig til både extracellulære og intracellulære  $\beta$ -lactamaser.

Amoxicillin nedbrydes af  $\beta$ -lactamase og derfor udvider kombinationen med en effektiv  $\beta$ -lactamasehæmmer (clavulansyre) rækken af bakterier som det er aktivt overfor til også at omfatte arter der producerer  $\beta$ -lactamase.

Begge komponenter absorberes godt efter oral administration. Hos hunde er systemisk biotilgængelighed af amoxicillin 60-70 %. Hovedparten af dosis udskilles uomdannet med urinen.

### Indikationer:

Noroclav Vet tabletter er indiceret til behandling af infektioner forårsaget af  $\beta$ -lactamase producerende stammer af bakterier, der er følsomme overfor amoxicillin/clavulansyre kombinationen: Hudsygdomme /inkl. dyb og overfladisk pyoderma) forårsaget af amoxicillin/clavulansyre følsomme bakterier. Urinvejsinfektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyre følsomme bakterier eller Escherichia coli. Luftvejsinfektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyre følsomme stafylokokker. Enteritis Det anbefales, at der foretages passende følsomhedstest ved behandlingsstart, og at behandlingen kun fortsætter, når der er påvist følsomhed over for kombinationen.

### Bivirkninger:

Overfølsomhedsreaktioner der ikke er dosisrelaterede kan forekomme med disse midler. Gastrointestinale symptomer (diarré, opkast) kan forekomme efter indtagelse af produktet. Allergiske reaktioner (såsom hud reaktioner, anafylaksi) kan lejlighedsvis opstå. Hvis der opstår allergiske reaktioner bør behandlingen ophøre.

### Kontraindikationer:

Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed overfor penicilliner.

Bør ikke gives til dyr med alvorlig funktionsforstyrrelser af nyrerne med anuria og oliguria.

### Interaktioner:

Chloramphenicol, makrolider, sulfonamider og tetracycliner kan hæmme pencillinernes antibakterielle effekt på grund af den hurtige indtræden af bakteriostatisk effekt. Risikoen for krydsallergi med andre penicilliner skal tages i betragtning. Penicilliner kan øge effekten af aminoglycosider.

### Laktation/drægtighed/diegivning:

Laboratorieforsøg i dyr viste ingen tegn på fosterskadende effekt.

### Cave:

Bør ikke gives til kaniner, marsvin, hamstere eller ørkenrotter.

### Deklaration:

50 mg tabletter: Amoxicillin 40 mg + clavulansyre 10 mg  
250 mg tabletter: Amoxicillin 200 mg + clavulansyre 50 mg  
500 mg tabletter: Amoxicillin 400 mg + clavulansyre 100 mg

### Dosering:

12,5 mg/kg to gange daglig i 5-7 dage.

### Holdbarhed og opbevaring:

50 mg + 250 mg: 18 måneder. 500 mg: 2 år.  
Må ikke opbevares over 25°C.

### Udlevering: B

### Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Norbrook Laboratories Limited  
Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP  
Storbritannien

### Dansk repræsentant:

ScanVet Animal Health A/S  
Kongevejen 66, 3480 Fredensborg

### Pakningsstørrelse:

V.nr.	Styrke	Pakning	
020021	50 mg	2x10 tabl.	Enkeltpakning
020086	50 mg	5x2x10 tabl.	Multipakning*
559429	250 mg	2x5 tabl.	Enkeltpakning
020006	250 mg	4x5 tabl.	Enkeltpakning
383330	250 mg	5x2x5 tabl.	Multipakning*
134418	500 mg	2x5 tabl.	Enkeltpakning
134441	500 mg	5x5 tabl.	Enkeltpakning
134453	500 mg	4x5x5 tabl.	Multipakning*
170301	500 mg	10x2x5 tabl	Multipakning*

\*Må deles til udlevering