



# Doxybactin

## Doseringssskema

### Styrker



- ▶ Alle tre styrker i smarttabs, **deles let i to eller fire lige store dele**
- ▶ Godkendt til både hund og kat
- ▶ Høj compliance med **smagskorrigeret tabletter**
- ▶ **Præcis dosering** helt ned til 0,75 kg IgV.



### DOSIS GIVES EN GANG DAGLIG

Legemsvægt	Dosis mg	Doxybactin Vet. 50 mg		Doxybactin Vet. 200 mg		Doxybactin Vet. 400 mg
0,75 kg – 1,25 kg	12,5	◐		-		-
1,25 kg – 2,5 kg	25	◑		-		-
2,5 kg – 3,75 kg	37,5	◒		-		-
3,75 kg – 5 kg	50	⊕		-		-
5 kg – 6,25 kg	62,5	⊕ ◐		-		-
6,25 kg – 7,5 kg	75	⊕ ◑		-		-
7,5 kg – 10 kg	100	⊕ ⊕		-		-
10 kg – 12,5 kg	125	⊕ ⊕ ◐		-		-
12,5 kg – 15 kg	150	⊕ ⊕ ⊕				-
15 kg – 20 kg	200	-		⊕		-
20 kg – 25 kg	250	⊕	OG	⊕		-
25 kg – 30 kg	300	-		⊕ ◐		-
30 kg – 35 kg	350	-		⊕ ◑		-
35 kg – 40 kg	400	-		-		⊕
40 kg – 45 kg	450	⊕	OG			⊕
45 kg – 50 kg	500	-		◐	OG	⊕
50 kg – 60 kg	600	-		⊕	OG	⊕
60 kg – 70 kg	700	-		⊕ ◐	OG	⊕
70 kg – 80 kg	800	-		-		⊕ ⊕

Holdbarhed for delte tabletter: 3 dage.

# Doxybactin

## DOXYBACTIN VET.

**Aktivt stof:** Doxycyclin som doxycyclinhydroclat.

**Lægemiddelform:** Tabletter, smartabs.

**Indikation:** Behandling af de følgende sygdomme forårsaget af bakterier følsomme over for doxycyclin: Hunde: Rhinitis forårsaget af *Bordetella bronchiseptica* og *Pasteurella* spp., Bronkopneumoni forårsaget af *Bordetella* spp. og *Pasteurella* spp., Interstitiel nefritis forårsaget af *Leptospira* spp.

Katte: Luftrøvsinfektioner forårsaget af *Bordetella bronchiseptica*, *Chlamydia felis* og *Pasteurella* spp.

**Bivirkninger og risici:** Mave-tarm-forstyrrelser, såsom opkastning, diarré og eosinophagitis, er blevet rapporteret som bivirkninger efter behandling med doxycyclin. Hos meget unge dyr kan der forekomme misfavnning af tænderne, da der dannes et tetracyclin-calciumphosphatkompleks. Der kan forekomme overfølsomhedsreaktioner, fotosensitivitet og i sjældne tilfælde fotodermatitis efter eksponering over for intens dagslys. Det er kendt, at der kan forekomme en forsinkelse af skeletvæksten hos unge dyr (reversibelt, når behandlingen seponeres), ved anvendelsen af andre tetracycliner, og det kan forekomme efter administration af doxycyclin. For at nedsætte sandsynligheden for eosinophageal irritation samt andre bivirkninger i mave-tarm-kanalen, skal præparatet administreres sammen med mad. Der bør tages særligt hensyn, når præparatet administreres til dyr med leversygdom, da der er blevet dokumenteret forhøjede leverenzymmer hos nogle dyr efter behandlingen med doxycyclin.

**Drægtighed og Diegning:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegning er ikke fastlagt. Klassen af tetracycliner kan forsinke skeletudviklingen hos fosteret (helt reversibelt), og det kan forårsage misfavnning af mælketænder. Evidens fra litteraturen om erfaring hos mennesker tyder på, at det er mindre sandsynligt, at doxycyclin vil forårsage disse anomalier, end andre tetracycliner. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risikoforholdet.

**Interaktion med andre lægemidler:** Må ikke administreres sammen med baktericide antibiotika, såsom penicilliner og cefalosporiner. Orale absorberende midler og stoffer, der indeholder multivalente kationer, såsom antacida og jernsalte, må ikke anvendes 3 timer før til 3 timer efter administrationen af doxycyclin.

Halveringstiden for doxycyclin nedsættes ved samtidig administration af antiepileptika, såsom phenobarbitaler og phenytoin.

**Dosering:** Den anbefalede dosis til hunde og katte er 10 mg doxycyclin pr. kg legemsvægt pr. dag. De fleste rutinemæssige tilfælde forventes at respondere efter 5 til 7 dages behandling. Behandlingen skal fortsætte 2 til 3 dage efter aktuelle infektioner er kureret klinisk. I kroniske eller refraktære tilfælde kan det være nødvendigt med et længere behandlingsforløb, op til 14 dage. Hos hunde med interstitiel nefritis på grund af leptospire, anbefales en 14 dages behandling. Hos katte med C. felis-infektioner anbefales det, at behandlingen administreres i 28 dage for at sikre, at organismen er elimineret.

**Pakningsstørrelser og pris:** 50mg 10 stk, 200mg 10stk og 400mg 10 stk blisterpakninger.

Se dagsaktuel pris på [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk)

**Udleveringsgruppe:** B.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen:**

Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Holland.

Dansk repræsentant: Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Uldum

