



Caniphedrin®

efedrinhydroklorid 20 mg & 50 mg



Caniphedrin® säger **STOPP** – SLUTA torka upp

Specifik sammandragning av
urinrörets interna sfinktermuskler
och en avslappning av
blåsmusklerna.

Effektiv behandling av
inkontinens.



Inkontinens drabbar

5-20 % av **tikar** !

Risikfaktorer¹:

- Kastrering
- Raser större än 15 kg

Ses ofta hos²:



Boxer



Schnauzer



Bobtail /
Old English
Sheepdog



Weimaraner



English Bulldog



Irish setter



Dobermann



Rottweiler

salfarm

www.salfarm.com

Doseringsvägledning:
Rekommenderade startdos är:
2 mg/kg dagligen under de första 10 dagarna.

När önskad effekt uppnåtts kan dosen
minskas till hälften eller lägre.

Vid återfall ökas dosen till 2 mg/kg igen.

Den dagliga dosen kan delas upp – t.ex.
morgon och kväll.

✓ TVÅ STYRKOR: 20 MG ELLER 50 MG

20 mg tabletter kan delas i 2 eller 4 lika stora delar. 50 mg tabletter kan delas i 2 delar

✓ HÖG EFFEKTIVITET

Upp till 93%³

✓ EFEDRIN HAR SPECIFIK EFFEKT

på α -receptorer i urinrörets interna sfinktermuskler

✓ ÖKAR SFINKTER-TONUS

och orsakar en avslappning av blåsmuskulerna



EKONOMISKA FÖR- PACKNINGSTORLEKAR

Med 100 tabletter

Källor:

1: Applegate et al. (2018): Urethral Sphincter Mechanism Incompetence in Dogs: An Update.

2: Hall et al. (2018): Urinary incontinence in male dogs under primary veterinary care in England: prevalence and risk.

3: Reichler et Huber (2014): Urinary Incontinence in the Bitch: An Update

Caniphedrin® (efedrinhydroklorid 20 & 50 mg) tabletter

Indikationsområde

Behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanism hos tikar som genomgått ovariohysterektomi.

Dosering

För oral användning. Rekommenderad startdos är 2 mg efedrinhydroklorid (motsvarande 1,64 mg efedrin) per kg kroppsvikt. Den dagliga dosen kan delas upp. När önskad effekt uppnåtts kan dosen minskas till hälften eller lägre. Baserat på den observerade effekten och med hänsyn till uppkomsten av biverkningar ska den individuella dosen justeras för att hitta den lägsta effektiva dosen. Den lägsta effektiva dosen ska bibehållas för långtidsbehandling. Vid ett återfall ska dosen ökas till 2 mg efedrinhydroklorid per kg kroppsvikt igen. När den effektiva dosen har fastställts ska hunden fortsatt kontrolleras regelbundet.

Kontraindikationer

Använd inte till hundar med kardiovaskulär sjukdom, hypertyreos, diabetes mellitus, nedsatt njurfunktion eller glaukom. Använd inte samtidigt med halogenerade narkosmedel. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Biverkningar

I sällsynta fall har ökad pulsfrekvens, kammararytmi och excitation av centrala nervsystemet observerats. Dessa symtom försvinner efter dosminskning eller avslutad behandling. Följande biverkningar kan uppkomma vid den rekommenderade terapeutiska dosen: Kardiovaskulära effekter (som takykardi, förmaksflimmer, stimulering av hjärtats aktivitet och kärlsammansamdragnin), stimulering av centrala nervsystemet (som leder till sömnlöshet, excitation, ångest och muskeltremor), mydriasis, bronkodilatation och minskad mängd slem som frisätts från slemhinorna i andningsvägarna, nedsatt motilitet och tonus i tarmväggen.

Interaktion

Risken för biverkningar kan vara förhöjd vid administrering tillsammans med metylxantiner och sympatomimetika. Kan förstärka metabolismen av glukokortikoider. Samtidig användning med MAO hämmare kan leda till hypertoni. Kan öka risken för teofyllintoxicitet. Risk för hjärtarytmi vid kombination med hjärtglykosider, kinin, tricykliska antidepressiva och halogenerade narkosmedel. Substanter som leder till en ökning av pH värdet i urinen kan förlänga utsöndringen av efedrin. Substanter som leder till en minskning av pH värdet i urinen kan påskynda utsöndringen av efedrin, vilket kan leda till nedsatt effekt. Kärlsammansamdragnin kan uppkomma efter samtidig behandling med ergotalkaloider och oxytocin. Sympatolytika kan minska effekten av efedrin.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Hundens kardiovaskulära funktion ska bedömas noggrant innan behandling påbörjas med läkemedlet och ska kontrolleras regelbundet under behandlingen. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:** Personer som är överkänsliga för efedrin ska undvika kontakt med läkemedlet. Efedrinhydroklorid kan vara toxiskt om det förtärs och intag kan vara dödligt, särskilt hos barn. Biverkningar kan inkludera sömnbesvär och nervositet, yrsel, huvudvärk, ökat blodtryck och ökade svettningar och illamående. För att förhindra oavsiktligt intag, särskilt av ett barn, måste läkemedlet administreras utom synhåll för barn. Oanvända tabletdelar ska läggas tillbaka i det öppna blistret, läggas tillbaka i kartongen och förvaras på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Vid oavsiktligt intag, framför allt av barn, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Det rekommenderas starkt att gravida kvinnor använder handskar vid administrering. Tvätta händerna noggrant efter administrering.

Dräktighet och laktation

Ej relevant.

Överdoser

Vid hög överdosering: takykardi, takyarytmi, kräkningar, ökade svettningar, hyperventilering, muskelsvaghet, tremor med hyperexcitation och rastlöshet, ångest och sömnbesvär. Följande symtomatisk behandling kan sättas in: Magsköljning vid behov. Vid svår hyperexcitation, administrering av sedativa läkemedel såsom diazepam eller neuroleptika. Vid takyarytmi, administrering av betablockerare. Ökad utsöndring genom surgörande av urinen och ökad diures.

Förpackningsstorlekar:

Kartong innehållande 10 blister med 10 tabletter vardera.

ATC-kod: QG04BX90

Hållbarhet: Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Oanvända delade tabletter ska läggas tillbaka i blistret och användas vid nästa dosering.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Österrike.

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad. För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån, 25467 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com