

Caniphedrin®

efedrinhydroklorid 20 & 50 mg
tabletter



Egenskaper

Caniphedrin® orsakar en specifik sammandragning av urinrörets interna sfinktermuskler och en avslappning av blåsmuskulerna.

Caniphedrin® stimulerar direkt alfa- och betaadrenerga receptorer och stimulerar även frisättningen av katekolaminer från sympatiska nerver.

Djurslag

Hund.

Indikation

Behandling av urininkontinens hos tikar som genomgått ovariohysterektomi.

Dosering och administrering

Tabletter för oral användning.

20 mg tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

50 mg tabletterna kan delas i 2 lika stora delar.

Rekommenderad startdos: 2 mg per kg kroppsvikt per dag under de första 10 behandlingsdagarna.

Den dagliga dosen kan delas upp. När önskad effekt uppnåtts kan dosen minskas till hälften eller lägre. Den individuella dosen justeras till den lägsta effektiva dosen för långtidsbehandling. Vid ett återfall ska dosen ökas till 2 mg per kg kroppsvikt igen. När den effektiva dosen har fastställts ska hunden fortsatt kontrolleras regelbundet.

Förpackning

20 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 05 10 25)

50 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 46 70 82)



Se baksidan för mer information.

salfarm
www.salfarm.com

Inkontinens

Caniphedrin®

efedrinhydroklorid 20 & 50 mg
tabletter

Indikation

Behandling av urininkontinens på grund av otillräcklig uretral sfinktermekanisk hos tikar som genomgått ovariohysterektomi.

Dos och administreringsätt

För oral användning. Rekommenderad startdos är 2 mg efedrinhydroklorid (motsvarande 1,64 mg efedrin) per kg kroppsvikt. Den dagliga dosen kan delas upp. När önskad effekt uppnåtts kan dosen minskas till hälften eller lägre. Baserat på den observerade effekten och med hänsyn till uppkomsten av biverkningar ska den individuella dosen justeras för att hitta den lägsta effektiva dosen. Den lägsta effektiva dosen ska bibehållas för långtidsbehandling. Vid ett återfall ska dosen ökas till 2 mg efedrinhydroklorid per kg kroppsvikt igen. När den effektiva dosen har fastställts ska hunden fortsatt kontrolleras regelbundet.

Överdoser

Vid hög överdosering: takykardi, takyarytmi, kräkningar, ökade svettningar, hyperventilering, muskelsvaghet, tremor med hyperexcitation och rastlöshet, ångest och sömnbesvär. Följande symtomatisk behandling kan sättas in: Magsköljning vid behov. Vid svår hyperexcitation, administrering av sedativa läkemedel såsom diazepam eller neuroleptika. Vid takyarytmi, administrering av betablockerare. Ökad utsöndring genom surgörande av urinen och ökad diures.

Kontraindikationer

Använd inte till hundar med kardiovaskulär sjukdom, hypertyreos, diabetes mellitus, nedsatt njurfunktion eller glaukom. Använd inte samtidigt med halogenerade narkosmedel. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Biverkningar

Ökad puls, ventrikulär arytm, excitation, takykardi, förmaksflimmer, ökad hjärtfrekvens, perifer kärlsammmandragning, sömnlöshet, ångest, muskeltremor, mydriasis, bronkodilatation och minskad mängd slem som frisätts från slemhinnorna i andningsvägarna). hypomotilitet i mag-tarmkanalen.

Interaktioner

Risken för biverkningar kan vara förhöjd vid administrering tillsammans med metylxantiner och sympatomimetika. Kan förstärka metaboliseringen av glukokortikoider. Samtidig användning med MAO hämmare kan leda till hypertoni. Kan öka risken för teofyllintoxicitet. Risk för hjärtarytmi vid kombination med hjärtglykosider, kinin, tricykliska antidepressiva och halogenerade narkosmedel. Substanter som leder till en ökning av pH värdet i urinen kan förlänga utsöndringen av efedrin. Substanter som leder till en minskning av pH värdet i urinen kan påskynda utsöndringen av efedrin, vilket kan leda till nedsatt effekt. Kärlsammmandragningar kan uppkomma efter samtidig behandling med ergotalkaloider och oxytocin. Sympatolytika kan minska effekten av efedrin.

Särskilda varningar

Läkemedlet är inte lämpligt att användas vid beteendeorsakad urininkontinens. Hos tikar under 1 års ålder ska eventuella anatomiska avvikelser som bidrar till inkontinens beaktas före behandling. Det är viktigt att identifiera eventuell underliggande sjukdom som orsakar polyuri/polydipsi (PU/PD), vilka felaktigt kan diagnostiseras som urininkontinens.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Hundens kardiovaskulära funktion ska bedömas noggrant innan behandling påbörjas med läkemedlet och ska kontrolleras regelbundet under behandlingen. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:** Personer som är överkänsliga för efedrin ska undvika kontakt med läkemedlet. Efedrinhydroklorid kan vara toxiskt om det förtärs och intag kan vara dödligt, särskilt hos barn. Biverkningar kan inkludera sömnbesvär och nervositet, yrsel, huvudvärk, ökat blodtryck och ökade svettningar och illamående. För att förhindra oavsiktligt intag, särskilt av ett barn, måste läkemedlet administreras utom synhåll för barn. Oanvända tablettedelar ska läggas tillbaka i det öppna blistret, läggas tillbaka i kartongen och förvaras på en säker plats utom syn- och räckhåll för barn. Vid oavsiktligt intag, framför allt av barn, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Det rekommenderas starkt att gravida kvinnor använder handskar vid administrering. Tvätta händerna noggrant efter administrering.

Dräktighet och laktation

Ej relevant.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Oanvända delade tabletter ska läggas tillbaka i blistret och användas vid nästa dosering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förpackningsstorlek:

Kartong innehållande 10 blister med 10 tabletter vardera.

ATC-kod: QG04BX90

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.