



Gastroskopi - journal og behandlingsplan

Patient- og ejeroplysninger

Hestens navn:
Alder:
Race:
Ejer:
Adresse:
Email:
Tlf:
Dato og dyrlæge:

Gastroskopijournal


Markér her sår i den ikke-glandulære hvide del

Grad	Cardia	Squamous fundus	Margo plicatus
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Markér her ved sår i den glandulære røde del

Beskrivelse af glandulære sår	Glandulære fundus	Margo plicatus	Pyloric antrum	Pylorus
Flad og hæmorigisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flad og fibrinosuppurativ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hævet og hæmorigisk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hævet og fibrinosuppurativ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nedsunken +/- blodkoagel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nedsunken og fibrinosuppurativ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Angiv placering af sår i maven



Historie

Tidligere historie om mavesår	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Tidligere gastroskoperet?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Dato for tidligere diagnose:	
Nuværende eller tidligere medicin:	
Nuværende foderplan:	

Symptomer

Kliniske tegn?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Nedsat præstation?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Adfærds ændring?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Smerter i gjordlejet?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Ændringer i pels?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Vægttab eller ændring i huld?	J <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>
Andet:	

Behandlingsplan

Behandling	Dosis	Start	Slut
Equinor × dagligt i dage	Til kg		

Forslag til rutiner

Indgivelses af medicin - herunder hvordan det indgives, hvor ofte, optimalt tidspunkt og efterfølgende fodring.

Equinor bør gives ca. 60 min før morgenfodring eller på det tidspunkt hvor mavesækken er mest tom f.eks lang tid efter fodring.

Fodring

Motion

Fold