





Diazedor® vet.

diazepam 5 mg/ml
injektionsvätska, lösning



EGENSKAPER

Diazedor® vet. innehåller diazepam

Diazepam är ett lugnande och muskelavslappnande medel som binder till GABA_A-receptorer och förstärker således den hämmande effekten av GABA. Denna mekanism ger upphov till lugnande, ångstdämpande, muskelavslappnande och antikonvulsiva effekter medans en minimal påverkan av kretslopp och respiration ses. Diazepam är förstavalet vid status epilepticus

Första registrerade veterinära diazepam

Djurslag

Hund och katt

Indikationer

För kortvarig behandling av krampsjukdomar och skelettmuskel-spasmer av centralt och perifert ursprung

Som del av ett preanestetiskt protokoll eller ett sederingsprotokoll

Dos och administreringssätt

Får endast administreras som långsam, intravenös injektion

Kortvarig behandling av krampsjukdomar: 0,5-1,0 ml/5 kg
Administreras som en bolusdos och upprepas upp till tre gånger, efter minst 10 minuter varje gång

Kortvarig behandling av skelettmuskelspasm: 0,5-2,0 ml/5 kg

Som del av ett sederingsprotokoll: 0,2-0,6 ml/5 kg

Som del av ett preanestetiskt protokoll: 0,1-0,2 ml/5 kg

Förpackningsstorlek

10 x 2 ml (Vnr 15 76 68)



Se baksidan för mer information

Läkemedelsform

Diazedor® vet. (diazepam) 5 mg/ml, injektionsvätska, lösning för hund och katt.

Indikationer

För kortvarig behandling av krampsjukdomar och skelettmuskelspasmer av centralt och perifert ursprung. Som del av ett preanestetiskt protokoll eller ett sederingsprotokoll.

Dos och administreringsätt

Får endast administreras som långsam, intravenös injektion. Kortvarig behandling av krampsjukdomar: 0,5-1,0 ml/5 kg. Kortvarig behandling av skelettmuskelspasm: 0,5-2,0 ml/5 kg. Som del av ett sederingsprotokoll: 0,2-0,6 ml/5 kg. Som del av ett preanestetiskt protokoll: 0,1-0,2 ml/5 kg.

Överdoser

Vid administrering ensamt kan överdosering av diazepam orsaka signifikant CNS depression. Hypotoni och andnings- och hjärtdepression är ovanliga händelser. Stödbehandling ska ges (kardiorespiratorisk stimulering, syrgas).

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. Använd inte vid svår leversjukdom.

Biverkningar

Snabb intravenös administrering kan orsaka hypotoni, hjärtsjukdomar och tromboflebit.

I sällsynta fall (0,01-0,1%), huvudsakligen hos små hundraser, kan paradoxala reaktioner observeras (såsom excitation, aggression eller disinhiberande effekt). I mycket sällsynta fall (<0,01%) kan användning av diazepam till katter orsaka akut levernekros och leversvikt. Andra rapporterade biverkningar inkluderar ökad aptit (i huvudsak hos katt), ataxi, förvirring, förändring av mental funktion och beteende.

Interaktioner

Diazepam är ett CNS depressivt medel som kan förstärka effekten av andra CNS depressiva medel såsom barbiturater, lugnande medel, narkotika eller antidepressiva medel. Diazepam kan öka effekten av digoxin. Cimetidin, erytromycin, azoler (såsom itraconazol eller ketokonazol), valproinsyra och propanol kan fördröja metabolismen av diazepam. Dosen av diazepam kan behöva minskas för att förhindra överdriven sedering. Dexametason kan minska effekten av diazepam. Samtidig användning av levertoxiska doser av andra substanser ska undvikas. Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: För strikt intravenös användning. Diazepam ensamt är mindre effektivt som lugnande medel vid användning till djur som redan är uppgjagade. Diazepam kan orsaka sedering och förvirring och ska användas med försiktighet till arbetsdjur. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Läkemedlet ska användas med försiktighet till djur med lever- eller njursjukdom och hos försvagade, uttorkade, anemiska, obesa eller geriatrika djur, djur i chock, koma eller med signifikant andningsdepression. Läkemedlet ska användas med försiktighet till djur med glaukom. Användning rekommenderas inte för att kontrollera krampsjukdom hos katter med kronisk klorpyrifostoxikos. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur: Läkemedlet är ett CNS depressivt medel. Undvik oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Kör inte bil. Personer som är överkänsliga för diazepam, andra bensodiazepiner eller något av hjälpämnen ska undvika kontakt med läkemedlet. Läkemedlet kan orsaka hudirritation. Undvik kontakt med huden. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Om irritationen kvarstår, sök läkare. Läkemedlet kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen. Om läkemedlet kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten och sök läkare om irritationen kvarstår. Diazepam kan vara skadligt för ett foster och ett ofött barn. Diazepam och dess metaboliter utsöndras i mjölk och har således en farmakologisk effekt på det ammande spädbarnet. Som sådant ska fertila kvinnor och kvinnor som ammar inte hantera läkemedlet. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Användning av läkemedlet för djurslagen under dräktighet och laktation har inte undersökts. Vid användning till lakterande honor ska valpar/kattungar övervakas noggrant för oavsiktlig sömnhet/lugnande effekter som kan påverka diande.

Förpackningsstorlek: 10 x 2 ml

ATC-kod: QN05BA01

Innehavare av godkännande för försäljning

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Østrig

Ombud: Salfarm Scandinavia AB,
Florettgatan 29C 2 vån, 254 67 Helsingborg,
Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.
För fullständig SPC se www.fass.se

08.2018/SE