



salfarm
www.salfarm.com

Ganutil

menbuton 100 mg/ml



Stimulering av
matsmättnings-
systemet och levern





Stimulering av aktivitet


i levern och matsmältningssystemet vid matsmältningsstörningar och störd leverfunktion

Menbuton är ett derivat av oxismörsyra som efter injektion ökar biliär, pankreatisk och peptisk sekretion med 2 till 5 gånger jämfört med de normala nivåerna av dessa.

Matsmältningsorgan	Effekt	Resultat
Mage	Ökar pepsinogen sekretion	Pepsinogen är ett proteolytisk enzym med betydelse för degradation av protein till mindre peptider
Lever	Ökar biliär sekretion	Ökar metabolismen. Förbättrar matsmältning och absorption
Gallblåsa	Ökar flödet av galla	
Pankreas	Ökar trypsinogen sekretion	Främjar degradation av peptider till aminosyror. Proportionel ökning av lipid och kolhydrat degradation (amylas aktivitet)

Menbuton främjar transport och assimilering av föda, och fungerar som ett leveravgiftande medel.

Menbuton kan förbättra de viktigaste metaboliska parametrarna och mjölkproduktionen post partum¹

Djurslag		Indikation ¹⁻⁴	Dosering
Nötkreatur		Indigestion Toxemi Ketos Anorexi Lever och pankreasinsufficiens	1 ml per 15-20 kg kroppsvikt Intravenöst
Kalvar		Som ovanför	1 ml per 10 kg kroppsvikt Djup intramuskulär eller långsam intravenös injektion
Häst		Toxemi Anorexi Kolik Lever och pankreasinsufficiens	1 ml per 20-40 kg kroppsvikt Långsam intravenös injektion
Gris		Indigestion Anorexi Intoxikation Lever och pankreasinsufficiens	1 ml per 10 kg kroppsvikt Djup intramuskulär eller långsam intravenös injektion
Får/get		Indigestion Toxemi Intoxikation Lever och pankreasinsufficiens	1 ml per 10 kg kroppsvikt Djup intramuskulär eller långsam intravenös injektion

Behandling
1 dag

Mjölk
0 dagar

Slakt
0 dagar

Inga kända interaktioner
med andra läkemedel, men
bör inte mixas med andra
läkemedel i samma spruta.



Källor:

1. Diepenbruck, Yasmine. Effect of Menbutone and Dexamethasone-21-isonicotinat during the postpartal period on metabolic stabilization and milk yield in dairy cows. (Universität Leipzig, 2010).
2. Summary of product characteristics GANUTIL 100 mg/mL.
3. Gruenberg, W. Intestinal diseases in cattle. MSD Vet. Manual. (2016).
4. Foreman, J. H. Overview of hepatic diseases in large animals. MSD Vet. Manual. (2016).



Ganutil menbuton 100 mg/ml injektionsvätska, lösning

Indikationer

Stimulering av aktivitet i levern och matsmältningssystemet vid matsmältningsstörningar och störd leverfunktion.

Dos och administreringssätt

Kalvar (upp till 6 månader), får, getter och svin:

10 mg menbuton per kg kroppsvikt administrerat antingen som en djup intramuskulär injektion eller en långsam intravenös injektion, motsvarande 1 ml injektionsvätska, lösning per 10 kg kroppsvikt.

Nötkreatur:

5-7,5 mg menbuton per kg kroppsvikt administrerat som intravenös injektion, motsvarande 1 ml injektionsvätska, lösning per 15-20 kg kroppsvikt.

Hästar:

2,5-5 mg menbuton per kg kroppsvikt administrerat som en långsam intravenös injektion, motsvarande 1 ml injektionsvätska, lösning per 20-40 kg kroppsvikt.

Administrering av läkemedlet kan vid behov upprepas en gång efter 24 timmar.

Överdoser

De rekommenderade doserna måste följas strikt eftersom säkerhetsfaktorerna för menbuton inte är kända. Kardiovaskulära läkemedel ska användas vid ett hjärtblock.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Använd inte till djur med hjärtsjukdom eller vid sena stadier av dräktighet.

Biverkningar

Efter intravenös administrering kan salivavsöndring, tårbildning, tremor, spontan urin- och avföring uppkomma. Efter intramuskulär administrering kan reaktioner vid injektionsstället (ödem, blödning, nekros) uppkomma. I mycket sällsynta fall kan anafylaxi-liknande reaktioner uppkomma.

Interaktioner

Inga kända.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Den intravenösa administreringen ska ges långsamt (under minst 1 minut) för att förhindra biverkningar. Mer än 20 ml på ett administrationsställe bör inte injiceras intramuskulärt. Till hästar rekommenderas endast långsam intravenös administrering.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Åt inte, drick inte och rök inte vid hantering av läkemedlet. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Använd inte under dräktighetens sista tredjedel.

Laktation: Detta läkemedel kan ges till lakterande djur.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn

Mjolk: Noll dygn

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

Förpackningsstorlek

1x100 ml

ATC-kod: QA05AX90

Innehavare av godkännande för försäljning

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Tyskland

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad. För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån, 25467 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com