

Lidor vet.

lidokain 20 mg/ml
injektionsvätska, lösning



Egenskaper

Lidor vet. innehåller lidokain. Lidokain har en lokalbedövande effekt genom att inducera reversibel nervblockad.

Lidor vet. är registrerad för flera djurslag och har ett flertal indikationer. Lidokain har en förebyggande effekt på hyperalgesi och reducerar dessutom den nödvändiga mängden inhalationsanestesi.

Hållbarhet efter öppning: 28 dagar.

Djurslag

Hund, katt och häst.

Indikationer

Infiltrations- och epiduralanestesi.

Häst dessutom: Oftalmisk ytanestesi, intraartikulär- och perineuralanestesi.

Hund och katt dessutom: Anestesi vid oftalmologi och tandvård.

Dosering och administrering

Den totala administrerade dosen ska inte överskrida:

Hund: 10 mg lidokain per kg kroppsvikt (0,5 ml/kg)

Katt: 6 mg lidokain per kg kroppsvikt (0,3 ml/kg)

Häst: 4 mg lidokain per kg kroppsvikt (0,2 ml/kg)

I samtliga fall ska dosen hållas till lägsta möjliga som behövs för att uppnå önskad effekt.

Se doseringsschema

För subkutan, intraartikulär, (intra-)okulär, perineural och epidural användning.

Dos vägledning HUND/KATT	Dos
Infiltrationsanestesi	Flera injektioner med 0,3-0,5 ml
Epidural lumbosakral anestesi	1-5 ml beroende på djurets storlek*
Ytanestesi vid oftalmologi	0,1-0,15 ml i konjunktivala fornix
Retrobulbar infiltration	Upp till 2 ml
Palpebral infiltration	Upp till 2 ml
Tandextraktion	Upp till 2 ml i foramen infraorbitale

*OBS: Hos katter är den maximala dosen 1 ml (20 mg lidokain) pr. djur

Dos vägledning HÄST	Dos
Oftalmisk ytanestesi	0,4-0,5 ml i konjunktivala fornix
Infiltrationsanestesi	2-10 ml för flera appliceringar
Intraartikulär	3-50 ml beroende på leden
Perineural anestesi	4-5 ml
Sakral epidural anestesi	10 ml för en häst som väger 600 kg
Posterior epidural anestesi	10 ml för en häst som väger 600 kg

Förpackning

50 ml (Vnr 55 01 47)

Se baksidan för mer information.



salfarm
www.salfarm.com

Lokalbedövning

Lidor vet.

lidokain 20 mg/ml
injektionsvätska, lösning

Läkemedelsform

Lidor vet. (lidokain) 20 mg/ml injektionsvätska, lösning.

Djurslag

Häst, hund och katt.

Indikationer

Häst: Oftalmisk ytanestesi, infiltrationsanestesi, intraartikulär anestesi, perineural anestesi och epiduralanestesi. Hund, katt: Anestesi vid oftalmologi och tandvård, infiltrationsanestesi och epiduralanestesi.

Dos och administreringsätt

För subkutan, intraartikulär, (intra)okulär, perineural och epiduralanvändning. Den totala administrerade dosen (inklusive användning av flera appliceringsställen eller upprepad administrering) ska inte överskrida 10 mg lidokain per kg kroppsvikt (0,5 ml/kg) hos hund, 6 mg lidokain per kg kroppsvikt (0,3 ml/kg) hos katt och 4 mg lidokain per kg kroppsvikt (0,2 ml/kg) hos häst. I samtliga fall ska dosen hållas till lägsta möjliga som behövs för att uppnå önskad effekt.

Överdoser

Vid överdosering kommer de första symptomen att vara dåsighet, illamående, kräkningar, tremor, excitation, ataxi och oro. Vid högre doser eller vid oavsiktlig intravenös injektion kan vissa mer allvarliga effekter av lidokainförgiftning uppstå, inklusive kardiorespiratorisk depression och kramper. Lidokainförgiftning behandlas enbart symptomatiskt med bland annat hjärt-lungräddning och kramplösande medel. Vid allvarligt blodtrycksfall ska volymersättning (chockbehandling) och kärlsammansdragande medel administreras. Hos katt, är myokarddepression det första förgiftningstecknet samt, i mer sällsynta fall, symptom relaterade till centrala nervsystemet.

Kontraindikationer

Använd inte vid inflammatorisk vävnadsförändring vid appliceringsstället, vid infekterad vävnad eller till nyfödda djur. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Biverkningar

Klumpiga rörelser eller måttlig, övergående excitation kan förekomma. Kardiiovaskulära effekter som myokarddepression, bradykardi, hjärtarytmi, lågt blodtryck och perifer vasodilatation kan också observeras. Dessa biverkningar är vanligtvis övergående. Överkänslighetsreaktioner mot lokal-anestetika, särskilt de av amidtyp, är sällsynta. Korsöverkänslighet mellan lokal-anestetika av amidtyp kan inte uteslutas. Användning av läkemedlet via infiltration kan fördröja läkning.

Interaktioner

Samtidig administrering av ceftiofur kan ge upphov till en ökning av den fria lidokainkoncentrationen på grund av en interaktion med plasmaproteinbindningen. Amiodaron, metoprolol eller propranolol kan ge upphov till en ökning av lidokainkoncentrationen i plasma och därmed förstärka dess farmakologiska effekter. Samtidig administrering av anestetika förstärker anestetikans effekt och deras doser kan behöva justeras. En betydande dos lidokain kan öka succinylkolins effekt. Samtidig användning av vasokonstriktiva medel förlänger den lokal-anestetiska effekten. Morfinliknande analgetika kan minska metabolismen av lidokain.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Detta läkemedel kan ge upphov till positiva resultat vid dopingtest på häst. Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Oavsiktlig intravenös injektion måste undvikas. Överskrid inte doser på 0,5 ml per kg kroppsvikt hos hund och 0,3 ml per kg kroppsvikt hos katt. Använd med försiktighet hos katt, eftersom de är mycket känsliga för lidokain. Överdoser och oavsiktliga intravenösa injektioner medför en hög risk för effekter på centrala nervsystemet och på hjärtat. Läkemedlet ska användas med försiktighet hos djur som lider av leversjukdom, hjärt-svikt, bradykardi, hjärtarytmi, hyperkalemi, diabetes mellitus, acidosis, neurologiska sjukdomar, chock, hypovolemi, svår andningsdepression eller påtaglig hypoxi. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur: Oavsiktlig självinjektion kan leda till kardiiovaskulära effekter och/eller CNS-effekter. Försiktighet ska iaktas för att undvika oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. KÖR INTE BIL. Lidokainmetaboliten 2,6-xylidin har visat mutagena och

genotoxiska egenskaper och är bekräftat carcinogent hos råttor. Detta läkemedel kan irritera hud, ögon och munslimhinna. Direktkontakt mellan injektionsvätskan och hud, ögon eller munslimhinna ska undvikas. Avlägsna kontaminerade kläder som har direktkontakt med huden. Vid oavsiktlig kontakt mellan läkemedlet och ögon, hud eller munslimhinna, skölj med rikliga mängder färskt vatten. Om symptom uppstår, uppsök läkare. Överkänslighetsreaktioner mot lidokain kan uppstå. Personer som är överkänsliga mot lidokain eller andra lokal-anestetika ska undvika kontakt med läkemedlet. Om överkänslighetssymptom uppstår, uppsök läkare.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation hos respektive djurslag. Lidokain passerar placentabarriären och kan ge upphov till neurologiska och kardiorespiratoriska effekter hos foster eller nyfödda.

Karenstider

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 3 dygn
Mjolk: 3 dygn

Förpackningsstorlek: 1 x 50 ml

ATC-kod: QN01BB02

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.