

# Rifen® vet.

ketoprofen 100 mg/ml  
injektionsvätska, lösning



## EGENSKAPER

**Rifen® vet.** är ett NSAID, med antiinflammatorisk, antipyretisk och analgetisk effekt

**Rifen® vet.** absorberas snabbt efter intramuskulär injektion

### Djurslag

Svin, häst och nötkreatur

### Indikationer

**Svin:** Sjukdomar associerade med inflammationer, smärta eller feber:

- Luftvägsinfektioner
- PPDS/MMA Syndrom
- Symptomatisk behandling av feber
- För kortvarig lindring av postoperativ smärta i samband med mindre mjukdelskirurgiska ingrepp såsom kastration av smågrisar.

**Häst:** Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer:

- Hälta efter trauma, artrit, osteit, spatt, tendinit, bursit, naviculit, fång och myosit
- Postoperativa inflammationer
- Symptomatisk behandling av kolik och feber

**Nötkreatur:** Sjukdomar associerade med inflammationer, smärta eller feber:

- Luftvägssjukdomar
- Mastit
- Hälta, artrit och lätt smärta efter förlossning
- Trauma
- För lindring av postoperativ smärta i samband med avhorning av kalvar.

### Dosering och administrering

Beroende på djurslag och indikation

### Karenstid

#### Slakt:

Nötkreatur:	i.v.	1 dygn (24 timmar)
	i.m.	3 dygn (72 timmar)
Svin:	i.m.	4 dygn
Häst:	i.v.	1 dygn (24 timmar)

### Förpackning

1 x 100 ml	(Vnr 12 80 86)
10 x 100 ml	(Vnr 12 80 97)

Se baksidan för mer information



## Djurslag

Svin, häst, nötkreatur

## Indikationer, specificera djurslag

**Svin:** Sjukdomar associerade med inflammationer, smärta eller feber: Behandling associerad med Postpartum Dysgalactia Syndrome (PPDS)/Mastit-Merit-Agalakti (MMA) Syndrom, luftvägsinfektioner och symptomatisk behandling av feber. För kortvarig lindring av postoperativ smärta i samband med mindre mjukdelsskirurgiska ingrepp såsom kastration av smågrisar. Vid behov bör ketoprofen kombineras med lämplig antimikrobiell behandling.

**Nötkreatur:** Sjukdomar associerade med inflammationer, smärta eller feber: Luftvägssjukdomar, mastit, ben/led och muskel/skelettrubbingar såsom hälta, artrit och lätt smärta efter förlösning, trauma och för lindring av postoperativ smärta i samband med avhorning av kalvar.

**Häst:** Sjukdomar i leder och muskel-skelettsystemet i förbindelse med akut smärta och inflammationer: Hälta efter trauma, artrit, osteit, spatt, tendinit, bursit, naviculit, fång och myosit. Ketoprofen är även verksamt vid postoperativa inflammationer, symptomatisk behandling av kolik och feber.

## Kontraindikationer

Ska inte användas vid känd överkänslighet för ketoprofen eller produktens hjälpämnen. Ska inte användas till djur som lider av gastro-intestinala besvär, hemorragisk diates, försämrad lever-, njur- eller hjärtfunktion. Ska inte användas tillsammans med andra NSAID och inte inom 24 timmar efter det att andra NSAID har givits.

## Biverkningar

Beroende på verkningsmekanismen för NSAID (hämning av prostaglandinsyntesen) kan irritation och sårbildning i magtarmkanalen eller renal intolerans inträffa även efter korrekt användning. Intramuskulära injektioner kan ibland orsaka övergående irritation. Upprepad administration till svin kan resultera i reversibel aptitlöshet.

Allergiska reaktioner kan förekomma i mycket sällsynta fall. Sådana reaktioner kan utvecklas till ett allvarigare tillstånd (anafylaxi) som kan vara livshotande och bör behandlas symtomatiskt.

## Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Behandling av smågrisar med ketoprofen innan kastration reducerar postoperativ smärta i 1 timma. För att uppnå smärtlindring under operation är samtidig medicinering med ett passande anestetiskt/sedativt preparat nödvändig. Behandling av kalvar med ketoprofen innan avhorning reducerar postoperativ smärta. Enbart ketoprofen kommer inte att ge adekvat smärtlindring under avhorningsproceduren. För att uppnå smärtlindring under avhorning är samtidig medicinering med ett passande lokalanestetiskt preparat nödvändig.

**Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:** Undvik intra-arteriell injektion. Rekommenderade doser och behandlingstider skall inte överskridas. Skall användas med försiktighet vid administrering till djur med svår dehydrering, hypovolemi och hypotension, eftersom det finns en potentiell risk för ökad njurtoxicitet. Användning av ketoprofen rekommenderas inte till föl under 15 dagars ålder. Användning till djur under 6 veckors ålder eller till gamla djur kan medföra ytterligare risker. Om sådan användning inte kan undvikas, kan djuren behöva en lägre dos och noggrann skötsel. Se avsnitt *Dräktighet och laktation* angående användning av produkten på dräktiga ston och sugor. Under hela behandlingsperioden skall tillgången på dricksvatten vara tillräcklig. Vid kolik bör en behandling upprepas först efter en ytterligare noggrann klinisk undersökning.

**Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Personer med känd överkänslighet för ketoprofen eller bensylalkohol bör undvika kontakt med den veterinärmedicinska produkten. Undvik stänk på huden och i ögonen. Skölj med rikligt med vatten om detta inträffar. Om irritation kvarstår bör sjukvård kontaktas för medicinsk rådgivning. Tvätta händerna efter användning.

## Dräktighet och laktation

**Dräktighet:** Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har undersökts på dräktiga laboratedjur och nötkreatur. Inga negativa effekter noterades. Produkten kan användas till dräktiga kor. Eftersom säkerheten inte undersökts på svin skall produkten endast användas i dessa fall efter att en risk/nytta bedömning gjorts av ansvarig veterinär. Skall inte användas till dräktiga ston.

**Laktation:** Kan användas till lakterande kor.

## Dos och administreringsätt

**Svin:** 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt som en enstaka djup intramuskulär injektion, dvs. 3 ml per 100 kg kroppsvikt (= 0,03 ml/kg).

**Nötkreatur:** 3 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intravenöst eller djupt intramuskulärt upp till 3 på varandra följande dygn, dvs. 3 ml per 100 kg kroppsvikt. För att lindra postoperativ smärta i samband med avhorning bör läkemedlet administreras som en injektion intravenöst eller djupt intramuskulärt 10 – 30 minuter före ingreppet.

Hos nötkreatur bör volymen per injektionsställe för intramuskulär injektion inte överstiga 9 ml. Om injektionsvolymen överstiger 9 ml ska denna volym delas upp i flera doser, administrerade på olika injektionsställen.

**Häst:** 2,2 mg ketoprofen/kg kroppsvikt/dag intravenöst en gång dagligen i upp till 3- 5 på varandra följande dygn, dvs. 1 ml per 45 kg kroppsvikt.

För att behandla kolik är en injektion normalt tillräckligt. Varje vidare administration av ketoprofen kräver en ny bedömning av patientens kliniska status.

För att uppnå postoperativa smärtlindring bör läkemedlet ges 10- 30 minuter före ett kirurgiskt ingrepp. Särskild noggrannhet ska iaktas för att säkerställa korrekt dos; en lämplig injektionsspruta ska användas (dvs. spruta för lägre doser) och kroppsvikten bestämmas noggrant.

## Överdoser

Överdoser med NSAID kan medföra gastrointestinal sårbildning, förlust av proteiner och nedsatt lever- och njurfunktion. Vid toleransstudier utförda på svin uppvisade upp till 25% av djuren erosiva och/eller ulcerativa lesioner i både de aglandulära (pars oesophagica) och glandulära delarna av magsäcken efter doser som var tre gånger så höga som den rekommenderade (9 mg/kg) under 3 dagar eller vid den rekommenderade dosen (3 mg/kg) under tre gånger den rekommenderade tiden (9 dagar). Tidiga toxiska symptom utgörs av aptitlöshet och degig avföring eller diarré. Om överdoseringssymptom observeras bör symptomatisk behandling insättas. Förekomst av magsår är delvis dosberoende.

## Karenstid

**Kött och slaktbiprodukter:**

<b>Häst:</b>	i.v.	1 dygn (24 timmar)
<b>Nötkreatur:</b>	i.v.	1 dygn (24 timmar)
	i.m.	3 dygn (72 timmar)
<b>Svin:</b>	i.m.	4 dygn

**Mjök(kor):** 0 timmar

Ej godkänt för användning till lakterande ston som producerar mjök för humankonsumtion.

## Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år. Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 28 dygn.

## Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara glasflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Öppnad flaska förvaras vid högst 25 °C.

**Förpackningsstorlek:** 1 x 100 ml, 10 x 100 ml

**ATC-kod:** QM01AE03

## Innehavare av godkännande för försäljning

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike

**Ombud:** Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,  
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.

För fullständig SPC se [www.fass.se](http://www.fass.se)

02.2022/SE