

Saniotic® vet

mikonazolnitrat 23 mg/ml, prednisolonacetat 5 mg/ml,
polymyxin B-sulfat 0,53 mg/ml
örondroppar/kutan suspension



Egenskaper

Saniotic® vet är godkänt för behandling av otitis externa och små lokala hudinfektioner hos hund och katt.

Saniotic® vet har fungistatisk/fungicid, bactericid, akaricid och kortikosteroid effekt.

Indikationer

För behandling av extern otit och små lokaliserade ytliga hudinfektioner hos hund och katt orsakade av infektioner med följande bakterier och svampar:

Grampositiva bakterier: *Staphylococcus spp* och *Streptococcus spp*.

Gramnegativa bakterier: *Pseudomonas spp.* och *Escherichia coli*.

Svampar: *Malassezia pachydermatis*, *Candida spp.*, *Microsporum spp.* och *Trichophyton spp.*

Behandling av infestationer av *Otodectes cynotis* (öronskabb) om det samtidigt föreligger infektion med patogener känsliga för mikonazol och polymyxin B.

Dosering och administrering

Otitis externa: 5 droppar in i den yttre öronkanalen två gånger dagligen i minst 7–10 dagar och upp till 3 veckor.

Hudinfektioner: Några droppar på det infekterade hudområdet två gånger dagligen upp till 3 veckor.

Förpackning

1 x 20 ml (Vnr 52 79 14)

Se baksidan för mer information.



Saniotic® vet

mikonazolnitrat 23 mg/ml, prednisolonacetat 5 mg/ml,
polymyxin B-sulfat 0,53 mg/ml
öronddroppar/kutan suspension

Indikationer

Hund och katt: För behandling av inflammation i yttre hörselgången (extern otit) och små lokala ytliga hudinfektioner, orsakade av infektioner med följande bakterier och svampar, som är känsliga för mikonazol och polymyxin B: Grampositiva bakterier: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* Gramnegativa bakterier: *Pseudomonas spp.*, *Escherichia coli*. Jästs- vampar och svampar: *Malassezia pachydermatis*, *Candida spp.*, *Microsporum spp.*, *Trichophyton spp.*. Behandling av angrepp av *Otodectes cynotis* (öronskabb) om det samtidigt föreligger infektion med sjukdomsalstrande organismer som är känsliga för mikonazol och polymyxin B.

Dos och administreringssätt

För användning i örat och kutan användning hos hund och katt. Skaka ordentligt före användning. Innan man påbörjar behandlingen ska man klippa bort pälsen runt eller ovanpå det infekterade stället. Om det behövs gör man om detta under behandlingen. Infektioner i yttre hörselgången (extern otit): Rengör den yttre hörselgången och ytterörat och droppa i 5 droppar av det veterinärmedicinska läkemedlet i den yttre hörselgången två gånger om dagen. Massera örat och hörselgången noga så att de aktiva substanserna fördelas jämnt, men var försiktig så att djuret inte får ont. Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att de kliniska symtomen har upphört helt, i minst 7-10 dagar och upp till 14 dagar. Hudinfektioner (små lokala och ytliga): Applicera några droppar av det veterinärmedicinska läkemedlet på de infekterade hudområdena som ska behandlas två gånger per dag och massera noga. Behandlingen ska fortsätta utan avbrott till några dagar efter att de kliniska symtomen har upphört helt, upp till 14 dagar. I vissa envisa fall (öron- eller hudinfektioner) kan behandlingen behöva fortsätta i 2 till 3 veckor.

Överdoser

Inga andra symptom än de som är angivna i avsnittet om "Biverkningar".

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna i det veterinärmedicinska läkemedlet eller mot andra kortikosteroider (kortison), andra svampmedel av typen azolantimykotika, mot några hjälpämnen, till djur med hål i trumhinnorna, till djur där det är känt att smittämnen är motståndskraftiga mot polymyxin B och/eller mikonazol eller på bröstkörtlarna hos digivande tikar eller honkatter.

Biverkningar

Användning av detta veterinärmedicinska läkemedel kan i mycket ovanliga fall förknippas med förekomst av dövhet (speciellt hos äldre hundar). I detta fall ska behandlingen avbrytas. Andra sjukdomar i immunsystemet, infektion på applikationsstället, blödningar på applikationsstället, förtunning av hud, fördröjd läkning av sår, systemiska sjukdomar (t.ex. binjuresjukdomar), telangiektasi.

Interaktioner

Ingen data är tillgänglig.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Bakteriell otit och svampotit är ofta av sekundär natur. Den underliggande orsaken ska identifieras och behandlas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Användning baseras på identifikation och känslighetstester av bakterier och/eller svampar som isolerats. Om detta inte är möjligt ska behandlingen baseras på lokal epidemiologisk information och kunskap om målpatogenernas känslighet. Användningen bör vara i enlighet med officiella, nationella och regionala antimikrobiella riktlinjer. Ett antibiotikum med lägre risk för selektion av antimikrobiell resistens bör användas som förstahandsbehandling om möjligt. Vid recidiverande infestationer med *Otodectes cynotis* rekommenderas systemisk behandling med ett passande ektoparasitärt medel. Innan behandling måste integriteten av trumhinnan kontrolleras. Systemiska kortikosteroideffekter är möjliga, speciellt om läkemedlet används under ett täckförband, på omfattande hudlesioner med ökat blodflöde i huden, eller om djuret slickar i sig läkemedel. Förhindra att behandlade djur eller djur som har kontakt med behandlade djur får i sig läkemedel peroralt. Förhindra kontakt med djurets ögon. Vid oavsiktlig kontakt skölj omedelbart med rikligt med vatten. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Personer som är överkänsliga för prednisolon, polymyxin B eller mikonazol ska undvika kontakt med läkemedlet. Undvik kontakt med hud och

ögon. Vid oavsiktligt spill ska hud och ögon omedelbart sköljas med rikligt med vatten. Använd alltid engångshandskar när läkemedlet appliceras på ett djur. Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Absorptionen genom huden är låg, därför förväntas inga teratogena/embryotoxiska/fetotoxiska och modertoxiska effekter hos hund och katt. Behandlade djur kan eventuellt förtära de aktiva substanserna när de slickar sig och det kan förväntas att substanserna överförs till blod och mjölk. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-riskbedömning.

Förpackningsstorlek: 1 x 20 ml

ATC-kod: OS02CA01

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.