

Separon® vet.

azaperon 40 mg/ml
injektionsvätska, lösning



Egenskaper

Separon® vet. injektionsvätska, lösning.

Separon® vet. har sedativa och antiaggressiva effekter.

- Effekt inom 5-10 minuter.
- Sederingen varar 1-3 timmar.
- Alla effekter har släppt efter 6-8 timmar.

Djurslag

Gris.

Indikationer

Aggressivt beteende, behandling/förebyggande av stress eller vid obstetrik.

Premedicinering vid lokal anestesi eller narkos.

För symtomlindring hos djur med nutritionell muskeldystrofi.

Dosering och administrering

För intramuskulär användning:

Premedicinering vid lokal anestesi och narkos: 1 ml/20-40 kg

Aggressivt beteende och obstetrik: 1 ml/20 kg

Transportrelaterad stress:

Kultingar, avvanda kultingar och galtar: 1 ml/40 kg

Uggor och slaktgrisar: 1 ml/100 kg

Kardiovaskulär stress: 1 ml/100 kg

En dos på 1 ml/40 kg ska inte överskridas hos galtar eftersom en högre dos kan leda till prolaps av penis som därefter kan skadas.

Upprepad dosering till vietnamesiska hängbukssvin kan leda till dödsfall på grund av absorption av den initiala dosen i fett -

Om den initiala dosen inte tycks ha någon effekt, invänta total återhämtning innan ny injektion ges en annan dag.

Karenstid

Slakt: 18 dygn.

Förpackning

1 x 100 ml (Vnr 03 45 82)

Se baksidan för mer information.



salfarm
www.salfarm.com

Sedering

Separon® vet.

azaperon 40 mg/ml
injektionsvätska, lösning

Djurslag

Gris.

Indikationer

Ett sederande neuroleptikum för gris: För användning till djur med aggressivt beteende: (Efter omgruppering. Till suggor (grisningshysteri)). För användning till stressade djur och för att förebygga stress: (Kardiovaskulär stress. Transportrelaterad stress). Obstetrik. Som premedicinering vid lokal anestesi eller narkos. För symtomlindring hos djur med nutritionell muskeldystrofi.

Dos och administreringsätt

För intramuskulär användning. Ges som strikt intramuskulär injektion, bakom örat. En lång hypodermisk nål ska användas och injektionen ska ges så nära bakom örat som möjligt och vinkelrätt mot huden. Det finns en risk att en del av läkemedlet injiceras i fett om tunga djur injiceras med en kort nål i nacken. I detta fall kan injektionen ha obetydlig effekt.

Aggressivt beteende (omgruppering, grisningshysteri), obstetrik:

2 mg azaperon/kg kroppsvikt (dvs. 1 ml läkemedel per 20 kg kroppsvikt).

Stress:

Kardiovaskulär stress 0,4 mg azaperon/kg kroppsvikt (dvs. 0,2 ml läkemedel per 20 kg kroppsvikt).

Transportrelaterad stress:

Transport av kulingar, avvanda kulingar och galtar:

1,0 mg azaperon/kg kroppsvikt (dvs. 0,5 ml läkemedel per 20 kg kroppsvikt).

Transport av suggor och slaktgrisar: 0,4 mg azaperon/kg * kroppsvikt (dvs. 0,2 ml läkemedel per 20 kg kroppsvikt).

Premedicinering vid lokal anestesi och narkos, nutritionell muskeldystrofi:

1-2 mg azaperon/kg kroppsvikt (dvs. 0,5-1 ml läkemedel per 20 kg kroppsvikt).

En lämplig graderad spruta måste användas för korrekt administrering av den dosvolym som krävs. Detta är särskilt viktigt vid injektion av små volymer.

En dos på 1 mg/kg ska inte överskridas hos galtar eftersom en högre dos kan leda till prolaps av penis som därefter kan skadas.

Överdoser

Aggressivt beteende kan uppkomma under uppvaknade vid överdosering. Upprepad dosering till vietnamesiska hängbukssvin kan leda till dödsfall på grund av absorption av den initiala dosen i fett.

Kontraindikationer

Använd inte vid mycket kalla förhållanden eftersom kardiovaskulär kollaps och hypotermi kan uppkomma på grund av perifer vasodilatation. Kontraindicerat för användning vid transport eller för omgruppering av grisar som kommer att slaktas före avslutad karenstid. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Biverkningar

Salivavsöndring, tremor och flämtning kan uppkomma vid den högsta rekommenderade dosen. Dessa biverkningar försvinner spontant. Reversibel penisprolaps kan uppkomma hos galtar.

Interaktioner

Har en potentiell effekt på alla substanser som är centralt hämmande och substanser som är hypotensiva. Förstärkning av takykardi orsakad av adrenolytiska medel. Samtidig användning med α - och β -sympatomimetiska substanser såsom epinefrin (adrenalin) leder till hypotoni.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Injektion i fettvävnad kan leda till skenbar otillräcklig effekt. Under anslagstid ska behandlade djur lämnas ensamma i en tyst miljö. Enstaka dödsfall har observerats hos vietnamesiska hängbukssvin. Detta tros bero på injektion i fett som leder till långsam induktion och tendens att använda ytterligare doser som leder till överdosering. Det är viktigt att den angivna dosen inte överskrids hos denna ras. Om den initiala dosen inte tycks ha någon effekt, invänta total

återhämtning innan ny injektion ges en annan dag. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga för azaperon eller något av hjälpämnen ska undvika kontakt med läkemedlet. Kan vara irriterande för hud, ögon och munslemhinna. Tvätta bort stänk från hud, ögon och munslemhinna omedelbart med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Oavsiktlig självinjektion eller intag kan leda till sedering. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. **KÖR INTE BIL.** Detta läkemedel bör inte hanteras av gravida kvinnor. Data saknas om förekomst av azaperon i bröstmjölken hos ammande kvinnor. Ammande kvinnor ska hantera läkemedlet med extrem försiktighet. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter:

Gris: 18 dygn.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning 100 ml: 3 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningsstorlek: 1x100 ml

ATC-kod: QN05AD90

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.