

Spasmipur® vet.

hyoscinebutylbromid 20 mg/ml
injektionsvätska, lösning



EGENSKAPER

Spasmipur® vet. är ett spasmolytikum som leder till att glatt muskulatur i organen i buken och bäckenhålan slappnar av

Maximala koncentrationer nås inom några minuter efter administrering

Indikationer

- Behandling av kolik och akuta krampar i urinvägarna
- Vid procedurer som kräver nedsatt aktivitet i mag-tarmkanalen eller urinvägarna

Dosering och administrering

Långsam administrering rekommenderas

Hästar, nötkreatur och svin: 1 ml/50-100 kg i.v.
(1 ml/50 kg i.m.*)

Får: 1 ml/30 kg i.v. eller i.m.*

(*Endast då intravenös injektion inte är möjlig får Spasmipur vet. administreras intramuskulärt)

Behandlingen kan upprepas en gång 12 timmar efter initial administrering

För kliniska procedurer administreras Spasmipur® vet. endast intravenöst omedelbart före inaktivitet i mag-tarmkanalen eller urinvägarna önskas

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter:

Häst: 3 dygn
Nötkreatur: 2 dygn
Får: 18 dygn
Svin: 9 dygn

Mjölk:

Häst, nötkreatur och får: 12 timmar

Förpackning

1 x 50 ml (Vnr. 17 19 73)



Se baksidan för mer information

Läkemedelsform:

Injektionsvätska, lösning.

Djurslag

Häst, nötkreatur, svin, får.

Indikationer:

Behandling av akuta kramper i mag-tarmkanalen (kolik) och i urinvägar. Hjälpmedel vid procedurer som kräver nedsatt peristaltisk aktivitet i mag-tarmkanalen eller minskade kontraktioner i urinvägarna.

Dos och administreringsätt

För intravenös eller intramuskulär användning.

Hästar, nötkreatur och svin: 0,1–0,2 ml av läkemedlet/10 kg kroppsvikt genom intravenös injektion (motsvarande 0,2–0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt).

Får: 0,35 ml av läkemedlet/10 kg kroppsvikt genom intravenös injektion (motsvarande 0,7 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt).

Vid behov kan behandlingen upprepas en gång 12 timmar efter initial administrering enligt veterinärens kriterier. Endast då intravenös injektion inte är möjlig får läkemedlet administreras intramuskulärt vid den högre dos som anges för respektive djurslag.

För kliniska procedurer: Administrera omedelbart före inaktivitet i mag-tarmkanalen eller urinvägarna önskas. Administrera endast intravenöst vid kliniska procedurer.

Både vid intravenös och intramuskulär administrering rekommenderas en långsam injektion.

För att säkerställa administrering av korrekt dos ska kroppsvikt fastställas så noggrant som möjligt och doseringshjälpmedel eller sprutor med lämplig gradering ska användas. Gummiproppen kan punkteras maximalt 25 gånger.

Överdoser

Vid överdosering kan antikolinergiska symptom såsom urinretention, törst, takykardi, hämning av motilitet i mag-tarmkanalen och övergående synstörningar uppkomma. Vid behov kan parasympatomimetika administreras. Dessutom ska lämpliga stödjande åtgärder sättas in vid behov.

Kontraindikationer

Använd inte vid paralytisk ileus, mekanisk obstruktion eller hjärtsjukdomar. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. Använd inte till hästar med glaukom. Använd inte till hästar som är yngre än 6 veckor.

Biverkningar

I mycket sällsynta fall kan takykardi uppkomma. Hos hästar kan läkemedlet orsaka kolik på grund av hämrad motilitet.

Interaktioner

Kan förstärka de takykardiella effekterna av beta-adrenerga läkemedel och kan förändra effekten av andra läkemedel, såsom digoxin. Effekterna av hyoscinbutylbromid kan vara förhöjd vid samtidig användning av andra antikolinergika. Samtidig administrering med andra antikolinergika eller parasympatolytika ska undvikas.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Inga

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Personer som är överkänsliga för hyoscinbutylbromid eller bensylalkohol ska undvika kontakt med läkemedlet. Oavsiktlig självinjektion kan leda till kardiella och cirkulatoriska biverkningar. Undvik oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Läkemedlet kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare. Tvätta händerna efter användning. Om läkemedlet kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten och sök läkare om irritationen kvarstår.

Dräktighet och laktation

Laboratoriestudier på mus har inte givit belägg för teratogena effekter. Det saknas information om användning under dräktighet hos djurslagen. En effekt på glatt muskulatur i förlösningsskanalen kan uppkomma.

Hyoscinbutylbromid kan, i likhet med alla andra antikolinergika, hämma mjölkproduktionen. På grund av dess låga löslighet i fett är utsöndringen av hyoscinbutylbromid i mjölk mycket låg. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter:

Häst: 3 dygn

Nötkreatur: 2 dygn

Får: 18 dygn

Svin: 9 dygn

Mjölk:

Häst, nötkreatur och får: 12 timmar

Hållbarhet:

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 30 månader. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dygn

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsstorlek:

1 x 50 ml

ATC-kod: QA03BB01

Innehavare av godkännande för försäljning

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike.

Ombud: Salfarm Scandinavia AB,
Florettgatan 29C 2 vån, 254 67 Helsingborg,
Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.
För fullständig SPC se www.fass.se

03.2020/SE