



salfarm
www.salfarm.com


Spasmium® vet.


metamizolnatriummonohydrat 500 mg/ml
hyoscinbutylbromid 4 mg/ml



Spasmium® vet. kan användas vid spasmer och ökad ihållande tonus i glatt muskulatur och mag-tarmkanalen samt urin och gallvägar hos **nötkreatur**

1. Som underhållsterapi vid vänstersidiga löpmagsbehandlingar:
 - a) Preoperativt vid högersidigt flanksnitt
 - b) Postoperativt vid Grymerfixering av löpmagen
 - c) Postoperativt vid endoskopi-operation
 - d) Efter rullning
2. Blindtarmsdilation
3. Högersidig löpmagsdilation
4. Diarré som följer efter löpmagskatarr
5. Spasmer (kolik i mag-tarmkanalen, urin- och gallvägar)





Indikationsområde

Nötkreatur, svin och hund: Behandling av kramp och ihållande ökad tonus i glatt muskulatur i mag-tarmkanalen eller i urin- och gallvägarna, vilket är förknippat med smärta och som stödjande behandling av akut diarré.

Häst: Behandling av spasmodisk kolik, kramp och ihållande ökad tonus i glatt muskulatur i mag-tarmkanalen eller i urin- och gallvägarna, vilket är förknippat med smärta.

Dosering

Nötkreatur: 8ml/100 kg (svarande till 40 mg metamilzolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och 0,32 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt) intravenöst upp till två gånger dagligen i tre dagar.

Kalv: 1 ml/10 kg (svarande till 50 mg metamilzolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och 0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt) intravenöst upp till två gånger dagligen i tre dagar.

Svin: 1 ml/10 kg (svarande till 50 mg metamilzolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och 0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt) intramuskulärt som engångsinjektion.

Häst: 5 ml/100 kg (svarande till 25 mg metamilzolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och 0,2 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt) intravenöst som engångsinjektion.

Hund: 0,1 ml/kg (svarande till 50 mg metamilzolnatriummonohydrat/kg kroppsvikt och 0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kroppsvikt) intravenöst eller intramuskulärt som engångsinjektion. Kan upprepas efter 24 timmar.

Kontraindikationer

Bör inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser eller mot några hjälpämnen. Bör inte användas vid sår i magtarmkanalen, kroniska mag-tarmsjukdomar, mekaniska stenoser i mag-tarmkanalen, paralytisk ileus hos häst, sjukdomar i det hematopoetiska systemet, koagulopatier, njursufficiens, takyarytmi, glaukom och prostata-adenom.

Biverkningar

Hos häst och nötkreatur kan ibland en svag ökning av hjärtfrekvensen observeras. Hos hund kan smärtsamma reaktioner uppträda på injektionsstället omedelbart efter injektion som avtar snabbt. I mycket sällsynta fall kan anafylaktiska reaktioner uppträda. På grund av hyoscinbutylbromids farmakologiska egenskaper kan torra slemhinnor, paralytisk ileus, förstoppning och urinretention förekomma.

Interaktioner

Effekterna av metamilzolnatriummonohydrat/eller hyoscinbutylbromid kan förstärkas vid samtidig användning av andra antikolinergika eller analgetika. Samtidig användning av läkemedel som inducerar mikrosomala leverenzym reducerar halveringstiden för metamilzol. Samtidig administrering av neuroleptika kan leda till svår hypotermi. Risken för gastrointestinal blödning ökas vid samtidig användning av glukokortikoider och den diuretiska effekten av furosemid försvagas. Samtidig administrering av andra svaga analgetika ökar metamilzols effekter och biverkningar.

Den antikolinergiska effekten av kinidin och antihistaminer liksom de takykardiska effekterna av β -sympatomimetika kan förstärkas av detta veterinärmedicinska läkemedel.

Särskilda varningar

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: På grund av risken för anafylaktisk chock ska lösningar som innehåller metamilzol administreras långsamt när de ges intravenöst. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet: Personer som är överkänsliga för metamilzolnatriummonohydrat/eller hyoscinbutylbromid bör undvika kontakt med läkemedlet. Undvik att använda produkten om du är känslig för pyrazoloner eller acetylsalicylsyra. Hos ett mycket litet antal personer kan metamilzol orsaka reversibel men potentiellt allvarig agranulocytos och andra reaktioner såsom hudallergi. Undvik självinjektion. Tvätta omedelbart bort stänk från hud och ögon.

Dräktighet och digivning

Laboratiestudier på djur har inte givit belägg för teratogena effekter. Information saknas avseende användning under dräktighet hos de djurslag som produkten är avsedd för. En effekt på den glatta muskulaturen i förlossningskanalen kan förekomma.

Metamilzols metaboliter passerar placentabarriären och utsöndras i mjölken. Därför ska denna produkt endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Överdoser

Den akuta toxiciteten hos de båda aktiva substanserna är mycket låg. Ospecifika symptom omfattade: ataxi, mydriasis, takykardi, utmattning, krampfall, medvetslöshet och andningssymptom. Fysostigmin rekommenderas som motgift mot hyoscinbutylbromid. På grund av den parasymptolytiska aktiviteten hos hyoscinbutylbromid observerades i vissa fall en svag ökning av hjärtfrekvensen hos häst och nötkreatur efter administrering av dubbel terapeutisk dos.

Karenstider

Kött och slakt: Häst, nötkreatur: 12 dygn
Svin: 15 dygn
Mjolk: Nötkreatur: 96 timmar
Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion

Förpackning: 1 x 100 ml

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år.
Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar.

ATC-kod: QA03DB04

Innehavare av godkännande för försäljning

Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Österrike.

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån, 254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad. För fullständig SPC se www.fass.se