

Zitch Vet

permethrin 40 mg/ml
pour-on lösning



Egenskaper

Permethrin är ett klass 1 pyretroid med avstötande verkan. Permethrin påverkar natriumkanalen genom att förlänga både aktiveringen och inaktiveringen, vilket leder till överdriven retbarhet hos parasiten och dödar den.

Djurslag

Hästar och åsnor.

Indikationer

Hjälpmiddel för hantering av sommareksem genom den avstötande effekten på den bitande insektstypen *Culicoides* spp.

Dosering och administrering

1,0 ml per 10 kg kroppsvikt, upp till maximalt 40 ml

Appliceras i ungefär lika stora delar i hästens man och på hästens bakdel. Undvik sadelområdet. För de flesta hästar och åsnor är en behandling per vecka tillräckligt.

Om hästarna och åsnorna ska ryktas, ska produkten appliceras efter ryktningen.

Riktlinjer för dosering

Dos vägledning

Kroppsvikt (kg)	100	200	250	300	>400
Dosvolym (ml)	10	20	25	30	40

Karenstider

Ej godkänt för användning hos hästar eller åsnor som är avsedda för humankonsumtion.

Förpackning

1 x 250 ml (Vnr 49 58 98)

Se baksidan för mer information.



Zitch Vet

permethrin 40 mg/ml
pour-on lösning

Läkemedelsform

Pour-on lösning.

Djurslag

Hästar och åsnor.

Indikationer

Används som hjälpmedel för hantering av sommareksem genom den avstötande effekten på den bitande insektstypen *Culicoides* spp.

Dos och administreringsätt

Hästar och åsnor: 4 mg/kg kroppsvikt, motsvarande 1,0 ml per 10 kg kroppsvikt, upp till maximalt 40 ml. Den uppmätta dosen appliceras i ungefär lika stora delar i hästens man och på hästens bakdel. Sadelområdet ska undvikas. Påbörja behandlingen i början av sommareksemssäsongen. För de flesta hästar och åsnor är en behandling per vecka tillräckligt. Om hästarna och åsnorna ska ryktas, ska produkten appliceras efter ryktningen.

Överdoser

Darrningar, förhöjd retbarhet, ökad salivavsöndring, koreatetos (ofrivilliga vridande rörelser) och förlamning. Symtomen går snabbt över och djuren återhämtar sig vanligen inom en vecka. Det finns ingen specifik antidot, men symtomlindrande behandling kan ges om det anses nödvändigt.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. Använd inte på hästdjur med leversjukdom. Använd inte på katter.

Biverkningar

Vissa hästar, i synnerhet tunnhudade arabhästar, kan få biverkningar av behandling med denna produkt og efterföljande: Reaktion/irritation/alopeci på applikationsstället. För sådana hästar rekommenderas du utföra ett lapptest längst ned på halsen. Om biverkningar uppstår ska behandlingen avbrytas omedelbart. Eventuell resulterande hudirritation är snabbt övergående. Förfarande vid lapptestning: Använd skyddshandskar och applicera en mindre mängd produkt (cirka 1 ml) på ett identifierbart område längst ned på djurets halsparti genom att gnida in det i huden med en bomullspinne. Linda in den använda bomullsspinnen i handskarna och kassera på ett säkert sätt. Vid 24 timmar respektive 48 timmar efter appliceringen ska appliceringsområdet undersökas efter tecken på hudreaktioner (rodnad, svullnad, flagnande eller utsöndringar). Vid konstaterad reaktion ska produkten inte användas på djuret.

Interaktioner

Kan ha en skadande inverkan på vissa plaster. Produkten kan förlänga effekten av barbiturater.

Särskilda varningar

Orsaken till sommareksem anses vara överkänslighet mot bett från bevingade insektsarter som t ex *Culicoides* (svidknott). Förutom behandlingen bör även andra åtgärder vidtas för att minska exponeringen för sådana insekter i den mån det är genomförbart. Hästägare kan med fördel söka rådgivning av veterinär om hantering av hästar med sommareksem. Hästägare rekommenderas även rådfråga veterinär vid sommareksem som är svårartade eller inte svarar på behandling. Skyddet minskar om djuret tvättas eller utsätts för regn efter appliceringen av läkemedlet. Onödig användning av antiparasitära medel eller användning som avviker från anvisningarna i produktresumén kan öka urvalstrycket för resistens och leda till minskad effekt. Beslutet om läkemedlet ska användas eller inte ska fattas för varje enskilt djur på grundval av bekräftad parasitart och parasitbörda, eller risken för angrepp baserat på de epidemiologiska egenkaperna.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Endast för utvärtes bruk. Produkten får inte appliceras längre fram än öronen. Var noga med att undvika kontakt med ögonen. Vid oavsiktligt spill i djurets ögon, tvätta det utsatta ögat omedelbart och omsorgsfullt med rikliga mängder rent vatten och kontakta veterinär. Behandla inte sadelområdet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Produkten kan orsaka neurotoxiska effekter samt hud- och ögonirritation. Skyddskläder, stövlar och kemikalieresistenta handskar av tex gummi, polyvinylklorid eller nitrilgummi ska användas vid hantering. Oavsiktligt spill på huden eller i ögonen ska sköljas bort med vatten omedelbart. Tvätta händerna efter användningen. Använd på en plats med god ventilation. Försäkra dig om att det behandlade området är torrt innan du tillåter hudkontakt med det behandlade djuret. Vid oavsiktlig exponering, uppsök läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Förvaras på avstånd från mat, dryck och djurfoder.

Särskilda försiktighetsåtgärder för skydd av miljö:

Läkemedlet kan vara skadligt för vattenlevande organismer och bin. Förorena inte dammar, vattendrag och diken med läkemedlet eller den tomma behållaren.

Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

Karenstider

Ej godkänt för användning hos hästar eller åsnor som är avsedda för humankonsumtion.

Hållbarhet:

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 2 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut flaskan väl och förvara den torrt för att skydda den från fukt. Förvara flaskan i den yttre kartongen för att skydda den mot ljus.

Förpackningsstorlek

1 x 250 ml.

ATC-kod:

QP53AC04.

Innehavare av godkännande för försäljning

Floris Veterinaire Produkten BV, Kempenlandstraat 33 / 35,
5262 GK Vught, Nederländerna

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.