

Dosering og administration

Beregn dosis ved hjælp af 1 mg/m² medetomidin eller brug nedenstående doseringstabel.

Bemærk, at dosis pr. mg/kg falder, når kropsvægten stiger.



Hundens vægt (kg)	Dosis (ml)	Hundens vægt (kg)	Dosis (ml)
3,5 — 4	0,4	33,1 — 37	2,2
4,1 — 5	0,6	37,1 — 45	2,4
5,1 — 7	0,7	45,1 — 50	2,6
7,1 — 10	0,8	50,1 — 55	2,8
10,1 — 13	1,0	55,1 — 60	3,0
13,1 — 15	1,2	60,1 — 65	3,2
15,1 — 20	1,4	65,1 — 70	3,4
20,1 — 25	1,6	70,1 — 80	3,6
25,1 — 30	1,8	>80	3,8
30,1 — 33	2,0		

På grund af den forventede hurtige restitution efter sedation med Zenalpa er rutinemæssig administration af atipamezol ikke indiceret.

Atipamezol kan benyttes ved behov. Den anbefalede atipamezoldosis er 5 gange den administrerede medetomidindosis (i mikrogram), hvilket svarer til en dosisvolumen af atipamezol (5mg/ml) på den halve dosisvolumen af det administrerede Zenalpa (0,5 mg/ml medetomidin) givet ved intramuskulær inkektion.

Se venligst produktresuméet (SPC) for det specifik valgte atipamezolprodukt.



Scan QR-koden for at få flere oplysninger eller gå ind på: www.dechra.dk



Zenalpa[®]

Zennovation in Sedation

