



salfarm
www.salfarm.com

Hippozol vet.

omeprazol 400 mg

Omeprazol med eplesmak.
Gis med fôr
for enkel behandling.




En god
magesfølelse...



En god magefølelse...

Hippozol vet. granulat er det første registrerte veterinære legemiddelet som inneholder omeprazol i et magesyreresistent enterogranulat.

Den magesyreresistente coatingen gjør det mulig å behandle med kun 2 mg/kg, samt å gi Hippozol vet. med litt av hestens tørrfôr. ^{1, 2}




► Når en større mengde omeprazol kan passere ventrikkelen uskadet, så vil en tilsvarende større mengde også være tilgjengelig for kroppen.

Gis med tørrfôr - enkel behandling

Hvorfor kan Hippozol vet. gis med tørrfôr?

Det magesyre-resistente enterogranulatet i Hippozol vet. fører til at det ellers magesyrefølsomme omeprazol ikke nedbrytes i den lave pH i ventrikkelen, men i stedet kommer uskadet frem til tarmen.


I det basiske miljø i tarmen frigis omeprazol og blir absorbert. Via blodbanen når det frem til parietalcellene i magesekken og aktiveres. På den måten hemmes magesyresekretjonen effektivt.



Dosering ved behandling av magesår

2 mg omeprazol pr. kg kroppsvekt én gang daglig i 28 dager.

► Et brev Hippozol vet. pr. 200 kg kroppsvekt.

	Kroppsvekt	Antall brev pr. dag
	> 600 kg-800 kg	
	> 400 kg-600 kg	
	> 200 kg-400 kg	
	125-200 kg	





Hippozol vet. omeprazol 400 mg

ENTEROGRANULAT 400 mg til hest:

Hver dosepose inneh.: Omeprazol 400 mg, sukrose, talkum, laktose, natriumlaurylsulfat, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumstivelseglykolat, hypromellose, titandioksid, metakrylsyre-ethylakrylatkopolymer, trietylsitrat. Eplesmak.

Indikasjoner:

Behandling av magesår hos hest.

Dosering:

Alle indikasjoner: 1 administrering av 2 mg omeprazol pr. kg kroppsvekt pr. dag, 28 dager i strekk. Hver dosepose inneholder tilstrekkelig omeprazol til behandling av 200 kg kroppsvekt. Doseposer bør ikke deles. Beregn derfor anbefalt dose (2 mg/kg pr. dag) og rund opp til nærmeste 200 kg-dose. Bland beregnet antall hele doseposer i en liten mengde av hestens fôr. Preparatet skal kun blandes i tørrfôr og fôret skal ikke fuktes.

Kroppsvekt (kg)	125-200	201-400	401-600	601-800
Antall doseposer	1	2	3	4

Det anbefales å kombinere behandlingen med endringer i dyrehold og trening.

Administrering:

Til oral bruk.

Overdosering/Forgiftning:

Ingen uønskede effekter er sett etter daglig bruk i 91 dager med doser opptil 20 mg/kg hos voksne hester og føll >2 måneder. Ingen uønskede effekter (spesielt ingen uheldige effekter på sædkvaliteten eller reproduksjonsferd) er sett etter daglig bruk i 71 dager ved doser på 12 mg/kg på avlshingster. Det er ikke sett bivirkninger etter daglig bruk i 21 dager ved omeprazoldose på 40 mg/kg hos voksne hester.

Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger:

Ingen kjente.

Interaksjoner:

Omeprazol kan forsinke eliminasjon av warfarin. Interaksjon med legemidler som metaboliseres i leveren kan ikke utelukkes. Omeprazol kan potensielt endre metabolismen av benzodiazepiner og forlenge CNS-effekter. Klaritromycin kan øke nivåene av omeprazol. Omeprazol kan redusere metabolismen av ciklosporin. Omeprazol kan redusere absorpsjonen av legemidler som krever nedsatt gastrisk pH for optimal absorpsjon (ketokonazol, itraconazol, jern, ampicillinester). Drektighet/Laktasjon: Laboratoriestudier på rotte og kanin har ikke vist teratogen effekt. Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering.

Forsiktighetsregler:

Sikkerhet er ikke testet på føll <8 måneder eller <125 kg, og anbefales derfor ikke til disse dyrene. Stress (inkl. krevende trening og konkurranser), føring og forhold knyttet til håndtering og dyrehold, kan være forbundet med utvikling av magesår. Personer som er ansvarlige for hesten bør vurdere å redusere magesårffremmende belastning ved endring av rutiner for dyreholdet, for å oppnå ett eller flere av følgende: Redusert stress, redusert fasting, økt fiberinntak og tilgang til beite. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet kan forårsake uønskede gastrointestinale effekter eller hypersensitivitetsreaksjoner (allergiske) ved utilsiktet inntak, dette gjelder særlig hos barn. Ikke spis eller drikk ved håndtering og administrering av preparatet. Vask hender og ev. eksponert hud etter bruk. Alle åpne doseposer skal legges tilbake i originalesken og oppbevares på korrekt måte og utlignelig for barn. Ved utilsiktet inntak, særlig hos barn, skal lege kontaktes dersom symptomer vedvarer.

Drektighet/Laktasjon:

Laboratoriestudier på rotte og kanin har ikke vist teratogen effekt. Sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering.

Tilbakeholdelsestider:

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: 2 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet:

Krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Pakningsstørrelse:

Enterogranulat: 400 mg: Til hest: 28 stk. (dosepose) Vnr 154469.

Reseptgruppe:

ATCvet-nr.: QA02B C01

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Tyskland

Kilder:

¹ SPC Hippozol vet. - Se på <https://www.legemiddelsok.no>

² Sykes BW, Hewetson M, Hepburn RJ, Luthersson N, Tamzali Y. European College of Equine Internal Medicine Consensus Statement – Equine Gastric Ulcer Syndrome in Adult Horses. J Vet Intern Med. 2015;29(5):1288–1299. doi:10.1111/jvim.13578.