

Ganutil

menbuton 100 mg/ml
injeksjonsvæske



EGENSKAPER

Menbuton (genabilsyre) stimulerer magesyre-, galle- og pankreassekresjon

Ganutil fremmer energiopptak og virker som et leveravgiftende stoff

Dyrearter

Kveg, gris, hest, sau og geit

Indikasjoner

Stimulering av lever- fordøyelsesaktivitet ved fordøyelsessykdommer og leverinsuffisiens

Dosering og Tilførselsvei

Kalv: (< 6 måneder), sau, geit og svin: 1 ml/10 kg i.v. eller dypt i.m.

Kveg: 1 ml/15-20 kg i.v.

Hest: 1 ml/20-40 kg i.v.

Kan gjentas én gang etter 24 timer

OBS: Administrasjon i.v. skal gjøres langsomt (ikke mindre enn 1 minutt) for å unngå bivirkninger

Tilbakeholdelsestid

Slakt: 0 døgn

Melk: 0 døgn

Pakningsstørrelse

1 x 100 ml. (Vnr. 03 94 11)



Se baksiden for mer informasjon

Ganutil

menbuton 100 mg/ml injeksjonsvæske

Ganutil «aniMedica GmbH»
Koleretikum.

Injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml til kveg, gris, hest, sau og geit: 1 ml inneh.: Menbuton 100 mg, etylendiamintetraeddiksyre, natriummeta-bisulfitt (E 223), klorokresol, etanolamin, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Stimulering av lever-fordøyelsesaktivitet ved fordøyelses-sykdommer og leverinsuffisiens.

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for inn-holdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr med hjertesykdom eller i sene sta-dier av drektighet.

Forsiktighetsregler: Skal ikke administreres med oppløsninger som inne-holder: Kalsium, prokainpenicillin eller vitamin B-kompleks.

Bivirkninger: Etter i.v. administrering kan spyttavsondring, tåreflom, skjelving, spontan urinering og avføring forekomme.
Etter i.m. administrering kan reaksjoner på injeksjonsstedet forekomme (ødem, blødning, nekrose). I svært sjeldne tilfeller kan anafylaksilignende reaksjoner, som bør behandles symptomatisk, forekomme.

Forsiktighetsregler: I.v. administrering skal gjøres langsomt (ikke <1 mi-nutt) for å unngå bivirkninger. Det anbefales å ikke injisere >20 ml i.m. på samme applikasjonssted. Til hest bør det kun brukes langsom i.v. admini-strering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer prepara-tet: Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner: Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon: Drektighet: Skal ikke brukes i siste trimester. Die-giving: Kan brukes til diegivende dyr.

Dosering:

Kalv ≤6 måneder, sau, geit og gris:
10 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/10 kg) gis enten dypt i.m. eller langsomt i.v. . Kveg: 5-7,5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/15-20 kg) gis i.v. Hest: 2,5-5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/20-40 kg) gis langsomt i.v.
Administreringen kan gjentas 1 gang etter 24 timer ved behov.

Overdosering/Forgiftning: Anbefalt dosering må strengt overholdes et-tersom sikkerhetsfaktorene for menbuton er ukjent. Behandling: Kardi-ovaskulære legemidler skal brukes ved tilfeller av hjerteblokk.

Tilbakeholdelsestider: Melk: 0 døgn. Slakt: 0 døgn.

Holdbarhet: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Oppbevares ved høyst 25°C.

Pakninger: 100 mg/ml

ATC vet kode: QA05AX90

Innehaver av markesføringstillatelsen:

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Tyskland

Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra:

Salfarm Scandinavia AS
Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com

08.2019/NO