



salfarm
www.salfarm.com

Ganutil

menbuton 100 mg/ml



Stimulering av
fordøyelsessystemet
og leveren





Stimulering av aktivitet


i leveren og fordøyelsessystemet ved
fordøyelsesforstyrrelser og nedsatt leverfunksjon

Menbuton er et derivat av oksybutansyre som etter injeksjon øker biliær, pankreatisk og peptisk sekresjon med 2 til 5 ganger sammenlignet med normale nivåer.

Fordøyelsesorgan	Effekt	Resultat
Mage	Øker pepsinogensekresjon	Pepsinogen er et proteolytisk enzym som har betydelse for nedbrytning av protein til mindre peptider
Lever	Øker biliær sekresjon	Øker metabolismen. Forbedrer fordøyelse og absorpsjon
Galleblære	Øker flyten av galle	
Pankreas	Øker trypsinogensekresjon	Fremmer nedbrytelse av peptider til aminosyrer. Proporsjonal økning i nedbrytning av lipider og karbohydrater (amylaseaktivitet)

Menbuton fremmer transport og assimilasjon av mat, og fungerer som ett leveravgiftende stoff.

Menbuton kan forbedre de viktigste
metabolske parametre og melke-
produksjon post partum?

Dyreart		Indikasjon ¹⁻⁴	Dosering
Kveg		Indigestion Toksemi Ketose Anoreksi Lever- og pankreasinsuffisiens	1 ml per 15-20 kg kroppsvekt Intravenøst
Kalver		Som over	1 ml per 10 kg kroppsvekt Dyp intramuskulær eller langsom intravenøs injeksjon
Hest		Toksemi Anoreksi Kolikk Lever- og pankreasinsuffisiens	1 ml per 20-40 kg kroppsvekt Langsom intravenøs injeksjon
Gris		Indigestion Anoreksi Intoksikasjon Lever- og pankreasinsuffisiens	1 ml per 10 kg kroppsvekt Dyp intramuskulær eller langsom intravenøs injeksjon
Sau/geit		Indigestion Toksemi Intoksikasjon Lever- og pankreasinsuffisiens	1 ml per 10 kg kroppsvekt Dyp intramuskulær eller langsom intravenøs injeksjon

Behandling
1 dag

Melk
0 dager

Slakt
0 dager

**Ingen kjente interaksjoner
med andre legemidler, men
bør ikke blandes med andre
legemiddel i samme sprøyte**



Kilder:

1. Diepenbruck, Yasmine. Effect of Menbutone and Dexamethasone-21-isonicotinat during the postpartal period on metabolic stabilization and milk yield in dairy cows. (Universität Leipzig, 2010).
2. Summary of product characteristics GANUTIL 100 mg/mL.
3. Gruenberg, W. Intestinal diseases in cattle. MSD Vet. Manual. (2016).
4. Foreman, J. H. Overview of hepatic diseases in large animals. MSD Vet. Manual. (2016).



Ganutil menbuton 100 mg/ml injeksjonsvåtska, lösning

Ganutil «aniMedica GmbH»
Koleretikum.

Injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml til kveg, gris, hest, sau og geit: 1 ml inneh.: Menbuton 100 mg, etylendiamintetraeddiksyre, natriummetabisulfitt (E 223), klorokresol, etanolamin, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Stimulering av lever-fordøyelsesaktivitet ved fordøyelsessykdommer og leverinsuffisiens.

Kontraindikasjoner: Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr med hjertesykdom eller i sene stadier av drektighet.

Forsiktighetsregler: Skal ikke administreres med oppløsninger som inneholder: Kalsium, prokainpenicillin eller vitamin B-kompleks.

Bivirkninger: Etter i.v. administrering kan spyttavsondring, tåreflom, skjelving, spontan urinering og avføring forekomme. Etter i.m. administrering kan reaksjoner på injeksjonsstedet forekomme (ødem, blødning, nekrose). I svært sjeldne tilfeller kan anafylaksilignende reaksjoner, som bør behandles symptomatisk, forekomme.

Forsiktighetsregler: I.v. administrering skal gjøres langsomt (ikke <1 minutt) for å unngå bivirkninger. Det anbefales å ikke injisere >20 ml i.m. på samme applikasjonssted. Til hest bør det kun brukes langsom i.v. administrering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ikke spis, drikk eller røyk under håndtering. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Interaksjoner: Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon: Drektighet: Skal ikke brukes i siste trimester. Diegiving: Kan brukes til diegivende dyr.

Dosering:

Kalv <6 måneder, sau, geit og gris:
10 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/10 kg) gis enten dypt i.m. eller langsomt i.v. . Kveg: 5-7,5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/15-20 kg) gis i.v. Hest: 2,5-5 mg/kg kroppsvekt (tilsv. 1 ml/20-40 kg) gis langsomt i.v.
Administreringen kan gjentas 1 gang etter 24 timer ved behov.

Overdosering/Forgiftning: Anbefalt dosering må strengt overholdes ettersom sikkerhetsfaktorene for menbuton er ukjent. Behandling: Kardiovaskulære legemidler skal brukes ved tilfeller av hjerteblokk.

Tilbakeholdelsestider: Melk: 0 døgn. Slakt: 0 døgn.

Holdbarhet: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Oppbevares ved høyst 25°C.

Pakninger: 100 mg/ml

ATC vet kode: QA05AX90

Innehaver av markesføringstillatelsen:

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Tyskland