

Caniphedrin®

efedrinhydroklorid 20 & 50 mg
tabletter



Egenskaper

Caniphedrin® forårsaker spesifikk en sammentrekning av de indre urinsfinktermusklene og en avslapning av blæremusklene.

Caniphedrin® stimulerer direkte alfa- og beta-adrenerge reseptorer. Det stimulerer også frigjøringen av katekolaminer fra sympatiske nevroner.

Dyrearter

Hund.

Indikasjoner

Behandling av urininkontinens forårsaket av lukkemuskelsvikt hos tisper som har gjennomgått ovariehysterektomi.

Dosering og tilførselsvei

Tabletter til oral bruk:

20 mg tablettene kan deles i 2 eller 4 like store deler.

50 mg tablettene kan deles i 2 like store deler.

Anbefalt startdose: 2 mg/kg de første 10 dagene. Daglig dose kan deles opp. Den individuelle dosen justeres for å finne den laveste effektive dosen. Den laveste effektive dosen bør opprettholdes for langvarig behandling. Ved tilbakefall bør dosen økes til 2 mg/kg igjen.

Pakningsstørrelse

20 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 05 10 25)

50 mg: 10 x 10 tabletter (Vnr 46 70 82)

Se baksiden for mer informasjon.



Caniphedrin®

efedrinhydroklorid 20 & 50 mg
tabletter

Indikasjoner

Behandling av urininkontinens forårsaket av lukkemuskelsvikt hos tisper som har gjennomgått ovariehysterektomi.

Dosering og tilførselsvei

Til oral bruk. 20 mg tablettene kan deles i 4, og 50 mg tablettene i 2 like deler for nøyaktig dosering. Anbefalt startdose er 2 mg per kg kroppsvekt. Den daglige dosen kan deles opp. Den individuelle dosen justeres for å finne laveste effektive dose. Denne bør opprettholdes for langvarig behandling. Ved tilbakefall bør dosen igjen økes til 2 mg efedrinhydroklorid per kg kroppsvekt. Når den effektive dosen er etablert, bør hunden fremdeles overvåkes regelmessig.

Overdosering/Forgiftning

Ved høye overdoser: takykardi, takyarytmi, oppkast, økt transpirasjon, hyperventilering, muskelsvakhet, skjelving med hypereksitasjon og rastløshet, angst og søvnløshet. Følgende symptomatiske behandling kan innledes: Mageskylling, om nødvendig. Ved alvorlig hypereksitasjon kan beroligende midler som diazepam eller nevroleptika administreres. Ved takyarytmi kan betablokkere administreres. Akselerert utskillelse ved å redusere PH i urinen og økt diurese.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes til hunder med kardiovaskulær sykdom, hypertyreose, diabetes mellitus, nedsatt nyrefunksjon eller glaukom. Skal ikke brukes samtidig med halogenerte narkotiske stoffer som halotan eller metoksyfluran. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet, eller noen av hjelpestoffene.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller økt pulsfrekvens, ventrikkelarytmi og eksitasjon av sentralnervesystemet. Disse symptomene forsvinner etter dosereduksjon eller seponering av behandlingen. Ukjent frekvens: takykardi, atrieflimmer, økt hjerteaktivitet, perifer vasokonstriksjon, søvnløshet, angst og muskelskjelvinger, mydriase, lungesykdommer, bronkodilatasjon og redusert slimdannelse i luftveisslimhinnene, hypo motilitet og tonus i fordøyelseskanalen.

Interaksjoner

Effekten av efedrin og risikoen for bivirkninger kan øke når det administreres sammen med metylxantiner og sympatomimetika. Efedrin kan øke glukokortikoidmetabolismen. Samtidig bruk med MAO-hemmere kan forårsake hypertensjon. Kan øke risikoen for teofyllin-toksitet. Risiko for hjertearytmi når det kombineres med hjerteglykosider (f.eks. digoksin), kinin, trisykliske antidepressiva og halogenerte narkotiske legemidler. Stoffer som fører til økt pH i urinen kan forlenge utskillelsen av efedrin, noe som kan føre til økt risiko for bivirkninger. Stoffer som fører til redusert pH i urinen kan akselerere utskillelsen av efedrin, noe som kan føre til redusert effekt. Vaskulære innsnevring kan oppstå etter samtidig behandling med ergotalkaloider og oksytocin. Sympatolytika kan redusere effekten av efedrin.

Spesielle advarsler og særlige forholdsregler

Det er ikke hensiktsmessig å bruke produktet ved uønsket vannlating forårsaket av atferdsmessige årsaker. Hos tisper under 1 år skal muligheten for anatomiske lidelser som bidrar til inkontinens vurderes før behandling. Det er viktig å identifisere alle underliggende sykdommer som forårsaker polyuri/polydipsi (PU/PD) som feilaktig kan diagnostiseres som urininkontinens. Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr: Hundens kardiovaskulære funksjon bør vurderes nøye før oppstart av behandling med veterinærpreparatet, og den bør overvåkes regelmessig under behandlingen. Særlige forholdsregler for personer som håndterer veterinærpreparatet: Ved hypersensitivitet overfor efedrin bør kontakt unngås. Kan være giftig ved svelging og inntak kan være dødelig, spesielt hos barn. Bivirkninger kan omfatte søvnløshet og nervøsitet, svimmelhet, hodepine, økt blodtrykk, økt svette dannelse og kvalme. For å unngå utilsiktet inntak, spesielt av barn, må veterinærpreparatet administreres utenfor barns synsvidde. Ubrukte tablettedeler skal legges tilbake i det åpne blisterrommet og puttes tilbake i esken og oppbevares på et trygt sted utilgjengelig for barn. Ved utilsiktet inntak, spesielt av barn, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Det anbefales sterkt at gravide kvinner bruker hansker ved administrering. Vask hendene grundig etter administrering.

Drekthet/Laktasjon

Ikke relevant.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet:

I uåpnet salgspakning: 3 år. Ubrukte delte tabletter skal legges tilbake i blisterpakningen og brukes til neste dose.

Oppbevaringsbetingelser

Oppbevar blisterpakningene i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Pakningsstørrelse: 100 stk (Pappeske med 10 blisterpakninger med 10 tabletter hver).

Reseptgruppe: C

ATCvet-nr.: QN 02 BB 02

Innehaver av markedsføringstillatelsen

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Østerrike.

Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra: Salfarm Scandinavia AS, Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til preparatomtalen godkjent av Direktoratet for medisinske produkter.