

Pulmistin® vet

klenbuterolhydroklorid 25 mikrogram/ml

oral lösning



Egenskaper

Pulmistin® vet binder till beta-2-adrenoreceptorer på den bronkiala cellmembranen och orsakar stark bronkvidgning.

Pulmistin® vet hämmar dessutom histaminfrisättning från mastceller i lungorna och förbättrar mukociliär rening av luftvägarna.

Djurslag

Häst.

Indikationer

Behandling av respiratorisk sjukdom där luftvägsobstruktion till följd av bronkospasmer och/eller ansamling av slem anses vara en bidragande faktor, och förbättrad mukociliär rening är önskvärd.

Dosering och administrering

Oral användning.

Administreras två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum enligt följande dosering:

Hålls över foder.

4 ml oral lösning/125 kg kroppsvikt, två gånger dagligen.

Behandlingen får inte pågå längre än tio dagar i följd.

Karenstid

Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn.

Ej godkänd för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Förpackning

1x360 ml flaska (Vnr 45 51 12)

Förpackningen innehåller dessutom en 25 ml spruta.

Se baksidan för mer information.



Pulmistin® vet

klenbuterolhydroklorid 25 mikrogram/ml
oral lösning

Läkemedelsform

Oral lösning.

Djurslag

Häst.

Indikationer

Behandling av respiratorisk sjukdom hos hästar där luftvägsobstruktion till följd av bronkospasmer och/eller ansamling av slem anses vara en bidragande faktor, och förbättrad mukociliär rening är önskvärd. Används ensamt eller som en adjuvant behandling.

Dos och administreringsätt

Oral användning. Läkemedlet ska administreras två gånger dagligen med ungefär 12 timmars mellanrum (minst 8 timmar) enligt följande dosering: Administrera 0,8 mikrogram klenbuterolhydroklorid per kilogram kroppsvikt (d.v.s. 0,7 mikrogram klenbuterol per kg kroppsvikt), motsvarande 4 ml oral lösning/125 kg kroppsvikt, två gånger dagligen. Behandlingen får inte pågå längre än tio dagar i följd. Läkemedlet administreras oralt genom att blandas i eller hålls över foder.

Överdoser

Doseringen av klenbuterolhydroklorid upp till 4 gånger den terapeutiska dosen (oralt administrerad) under en period av 90 dagar orsakade övergående biverkningar: Svettningar, hjärtklappning, muskelryckningar. Biverkningarna krävde inte behandling. Vid oavsiktlig överdosering, kan en β -blockerare användas som antidot.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot den aktiva substansen/hjälpämnen. Känd hjärtsjukdom.

Biverkningar

Sällsynta fall: Svettningar, muskelryckningar, takykardi, lättare hypotension, letargi eller rastlöshet.

Interaktioner

Verkan inklusive biverkningar kan förstärkas vid samtidig användning med glukokortikoider, β -2-sympatomimetika, antikolinergika och metylxantiner. Ska inte användas i kombination med andra sympatomimetika eller vasodilatorer. Störningar av hjärtrytm förväntas efter anestesi. Samtidig administrering av anestesimedel som innehåller halogener ökar risken för ventrikulär arytmi. Såväl vid användning vid lokal och allmän anestesi går det inte att utesluta en ökad vaskulär dilatation och blodtrycksfall, i synnerhet om läkemedlet används i kombination med atropin. Ökad risk för arytmi vid samtidig administrering av digitalisglykosider. Kan minska eller neutralisera effekterna av prostaglandin F_{2a} och oxytocin på livmodern. Klenbuterolhydroklorid är en β -adrenerg agonist, och kan därav neutraliseras av betablockerare.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Vid sjukdomsfall åtföljt av bakteriell infektion rekommenderas administrering av antimikrobiella medel. Vid glaukom får läkemedlet endast användas efter en noggrann risk-/nyttabedömning. Särskild försiktighet bör vidtas vid halotananestesi eftersom hjärtfunktionen kan uppvisa ökad känslighet för katekolaminer. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Detta läkemedel innehåller klenbuterol, vilket är en β -agonist som kan orsaka biverkningar såsom ökad hjärtfrekvens. Undvik hudkontakt och oavsiktlig förtäring. Lämna aldrig den fyllda sprutan utan uppsikt och säkerställ att flaskan är stängd omedelbart efter användning, för att förhindra oavsiktlig förtäring eller exponering för barn. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter användning. Detta läkemedel kan orsaka embryotoxicitet. Gravida kvinnor ska vara försiktiga när de hanterar läkemedlet. Använd handskar för att undvika hudkontakt. Läkemedlet kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer med känd överkänslighet för några av innehållsämnen ska undvika exponering för läkemedlet. Om besvär kvarstår med överkänslighet eller irritation, kontakta läkare genast och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren. Detta läkemedel kan irriterar huden och/eller ögonen. Undvik kontakt med hud och/eller ögon. Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta huden ordentligt. Spola omedelbart med rent vatten vid kontakt med ögon.

Dräktighet och laktation

Om läkemedlet används under dräktighet, bör behandlingen avbrytas minst 4 dagar före den förväntade födseln eftersom uteruskontraktioner kan hämmas eller födelse fördröjas. Undvik administrering till digivande ston eftersom läkemedlet utsöndras i mjölken. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under laktation.

Ett diande föl har ett stort intag av mjölk i relation till kroppsvikten. Därför kan man inte utesluta att den aktiva substansen som utsöndras i mjölken har effekt på det diande fölet.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn. Ej godkänd för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Hållbarhet

Oöppnad förpackning: 3 år.

Oöppnad innerförpackning: 3 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

Förpackningsstorlek:

360 ml flaska med doseringsspruta.

ATC-kod: QR03CC13

Innehavare av godkännande för försäljning

Floris Veterinaire Produkten BV, Kempenlandstraat 33, 5262 GK Vught, Nederländerna.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.