

When Goldie becomes an oldie...



Vitofyllin®

propentofyllin
50 mg & 100 mg
tabletter



salfarm
www.salfarm.com

Vitofyllin minskar symtomen på ålderdom hos hundar

Hos hundar förändras också prestation och motståndskraft med åldern. Många åldrandeprocesser är relaterade till cirkulationsförändringar. Vitofyllin förbättrar syretillförseln och kan därför öka hundens prestation, uthållighet och vaksamhet.

Flera positiva effekter

Hjärnan

- Minskar inflammatoriska processer
- Förbättrar mentala förmågor ⁽⁵⁾



Cirkulation och hjärta ⁽¹⁻⁴⁾

- Orsakar vasodilatation och minskar det vaskulära motståndet
- Positiv inotrop effekt och minskar arytmier
- Förbättrar blodflödet



Luftvägar

- Bronkidilaterande effekt (1)
- Positiv effekt på respiration
- Förbättrar upptag av syre



Trombocyter ⁽¹⁻⁴⁾

- Hämmar trombocyttaggregation
- Förbättrar blodflöde och cirkulation

Muskler

- Förbättrar blodflödet ^(2,3)
- Förbättrar stelheten ⁽¹⁾
- Minskar hundens svårigheter att resa sig och gå promenader ⁽¹⁾





- ▶ Förbättrar perifer och cerebral vaskulär cirkulation
- ▶ Stöd vid letargi och övergripande beteendeförändring
- ▶ Delbara tabletter - lämplig för hundar från 2,5 kg kroppsvikt
- ▶ Välkänd och dokumenterad substans – propentofyllin
- ▶ Ökar celler och organs tillgång till syre och näringsämnen ⁽¹⁻⁵⁾
- ▶ Ökar prestanda och motståndskraft ⁽¹⁻⁵⁾
- ▶ Allmän förbättring av åldrandet ⁽¹⁻⁵⁾

Dosvägledning 50 mg tabletter				
Kroppsvikt	Tabletter		Daglig totaldos tabletter	Daglig totaldos (mg/kg)
	Morgon	Kväll		
2,5–4 kg	1/4	1/4	1/2	6,3–10,0
5–7 kg	1/2	1/2	1	7,1–10,0
8–9 kg	3/4	3/4	1 1/2	8,3–9,4
10–15 kg	1	1	2	6,7–10,0

Dosvägledning 100 mg tabletter				
Kroppsvikt	Tabletter		Daglig totaldos tabletter	Daglig totaldos (mg/kg)
	Morgon	Kväll		
20–33 kg	1	1	2	6,0–10,0
34–49 kg	1 1/2	1 1/2	3	6,1–8,8
50–66 kg	2	2	4	6,1–8,0
67–83 kg	2 1/2	2 1/2	5	6,0–7,5



Vi gör det enklare att vara veterinär

Det ska vara enkelt för veterinärer att behandla små och stora djur och ge ägarna så bra råd som möjligt om djurens sjukdomar, hälsa och välbefinnande.

Därför ger vi på Salfarm råd till veterinärer om behandling av såväl husdjur som bruksdjur. Men vi gör mer än så: Vi svarar snabbt. Vi löser behandlingsbehov när de uppstår. Och vi samarbetar nära med våra kunder för att hitta de allra bästa lösningarna, även på nischmarknader.

Vi tror nämligen att en sund verksamhet måste byggas upp tillsammans med kunderna.

Så har vi arbetat sedan 1979, när köpmannen Helmer Nørgaard Olsen grundade Salfarm med endast en agentur för veterinärmedicinska läkemedel.

I dag är vi ett väletablerat företag med ett brett produktsortiment, högspecialiserade medarbetare, ett toppmodernt kvalitetsledningssystem och kunder i hela Skandinavien.

Vitofyllin® (propentofyllin 50 & 100 mg), tabletter. **Djurslag:** Hund. **Indikationer:** För att förbättra perifer och cerebral vaskulär cirkulation. För förbättring av matthet, letargi och allmänt uppträdande hos hundar. **Dos och administreringsätt:** Vanlig dos är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på två doser à 3-5 mg/kg. **Överdoser:** Excitation, takykardi, hypotoni, rodnad av slemhinnor och kräkningar. Utsättning av behandlingen leder till en spontan remission av dessa tecken. **Kontraindikationer:** Använd inte till hundar som väger mindre än 2,5 kg. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen. **Biverkningar:** Allergiska hudreaktioner, kräkningar, hjärtsjukdom. I dessa fall ska behandlingen avbrytas. **Interaktioner:** Inga kända. **Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning:** Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning till avsedda djurslag: Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas i enlighet därmed. Rationalisering av läkemedel till hundar som redan får behandling för kongestiv hjärtsvikt eller luftrörssjukdom ska övervägas. Vid njursvikt ska dosen reduceras. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur: Försiktighet ska iaktas för att undvika oavsiktligt intag. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter användning. **Dräktighet och laktation:** Använd inte till dräktiga eller lakterande tikar eller avelsdjur. **Hållbarhet:** Öppnad: 5 år. Delade tabletter: 72 timmar. **Särskilda förvaringsanvisningar:** Förvaras i originalförpackningen. Förvara blisterförpackningarna i ytterkartongen. Förvaras torrt. Delade tabletter ska förvaras i blisterförpackningen. **Förpackningsstorlek:** 50 mg: 56 tabletter, 100 mg: 140 tabletter. **ATC-kod:** QC04AD90. **Innehavare av godkännande för försäljning:** VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike.

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad. För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån, 254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Källor:

1. Ramirez E et al. Med. Vet. 1998;15(7-8): 399 – 408.
2. Hudlicka O et al. Br J Pharmacol 1981;72(4): 723 – 30.
3. Kapl D, Rudolph KA. Tierärztl. Prax. 1998;26:317 – 21.
4. Scaramuzzi RJ, Baker DJ. J Vet Pharmacol Ther 2003;26(5):327 – 35.
5. Posselt E. Das idiopathische Vestibulärsyndrom beim alten Hund 2017 Dissertation LMU München.