

Vitofyllin®

propentofyllin 50 & 100 mg

tabletter



Egenskaper

Vitofyllin® ökar blodflödet, särskilt i hjärnan, hjärtat och skelettmuskulatur. Hjärnan får därmed extra syre utan att hjärnans glukosbehov ökas. **Vitofyllin®** har en moderat positiv kronotrop effekt och en markant positiv inotrop effekt. Dessutom har det visat sig ha en antiarytmisk effekt hos hundar med myokardischemi och en bronkodilaterande effekt. **Vitofyllin®** hämmar trombocyttaggregation och förbättrar erytrocyternas flödesegenskaper. **Vitofyllin®** har en direkt effekt på hjärtat och minskar perifert vaskulärt motstånd, vilket minskar kardiell belastning. **Vitofyllin®** kan öka vilja att motionera och förbättra motionstolerans, framför allt hos äldre hundar.

Djurslag

Hund.

Indikation

För förbättring av perifer och cerebral vaskulär cirkulation.

För förbättring av matthet, letargi och allmänt uppträdande hos hundar.

Dosering

Vanlig dos är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på två doser à 3-5 mg/kg enligt följande:

50 mg

Kroppsvikt (kg)	Tabletter		Totalt antal dagliga tabletter	Daglig totaldos (mg/kg)
	Morgon	Kväll		
2,5 - 4	1/4	1/4	1/2	6,3 - 10,0
5 - 7	1/2	1/2	1	7,1 - 10,0
8 - 9	3/4	3/4	1 1/2	8,3 - 9,4
10 - 15	1	1	2	6,7 - 10,0
16 - 25	1 1/2	1 1/2	3	6,0 - 9,4
26 - 33	2	2	4	6,1 - 7,7

100 mg

Kroppsvikt (kg)	Tabletter		Totalt antal dagliga tabletter	Daglig totaldos (mg/kg)
	Morgon	Kväll		
20 - 33	1	1	2	6,0 - 10,0
34 - 49	1 1/2	1 1/2	3	6,1 - 8,8
50 - 66	2	2	4	6,1 - 8,0
67 - 83	2 1/2	2 1/2	5	6,0 - 7,5

Förpackningar

50 mg: 56 tabletter (Vnr 13 76 82)

100 mg: 140 tabletter (Vnr 47 50 18)

Se baksidan för mer information.



Vitofyllin®

propentofyllin 50 & 100 mg
tabletter

Djurslag

Hund.

Indikationer

För att förbättra perifer och cerebral vaskulär cirkulation. För förbättring av matthet, letargi och allmänt uppträdande hos hundar.

Dos och administreringsätt

Vanlig dos är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen, uppdelat på två doser à 3-5 mg/kg.

Överdoser

Excitation, takykardi, hypotoni, rodnad av slemhinnor och kräkningar. Utsättning av behandlingen leder till en spontan remission av dessa tecken.

Kontraindikationer

Använd inte till hundar som väger mindre än 2,5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Biverkningar

Allergiska hudreaktioner, kräkningar, hjärtsjukdom. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.

Interaktioner

Inga kända.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning till avsedda djurslag: Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas i enlighet därmed. Rationalisering av läkemedel till hundar som redan får behandling för kongestiv hjärtsvikt eller luftrörssjukdom ska övervägas. Vid njursvikt ska dosen reduceras. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur: Försiktighet ska iakttas för att undvika oavsiktligt intag. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Använd inte till dräktiga eller lakterande tikar eller avelsdjur.

Hållbarhet

Oöppnad: 5 år. Delade tabletter: 72 timmar

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Förvara blisterförpackningarna i yttre kartongen. Förvaras torrt. Delade tabletter ska förvaras i blisterförpackningen.

Förpackningsstorlek:

50 mg: 56 tabletter

100 mg: 140 tabletter

ATC-kod: QC04AD90

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.