

Vominil®

maropitant 10 mg/ml
injektionsvätska, lösning



Egenskaper

Maropitant är en neurokinin 1 (NK1) receptorantagonist, som verkar genom att hämma bindningen av substansen P. Betydande koncentrationer av substansen P finns i det emetiska centrumet och betraktas som den viktigaste neurotransmittorn i kräkningsprocessen. Maropitant är effektivt mot neurala och humoral (centrala och perifera) orsaker till kräkning.

- Bred indikation
- Stor flaska
- Gynnsam säkerhetsprofil¹

Djurslag

Hund och katt.

Indikationer

Hund:

- För att behandla och förebygga illamående som orsakas av kemoterapi.
- För att förebygga kräkning (förutom vid åksjuka).
- För att behandla kräkning, i kombination med andra stödande åtgärder.
- För att förebygga perioperativt illamående och kräkningar och förbättra återhämtning från generell anestesi efter användning av μ -opioidreceptoragonisten morfin.

Katt:

- För att förebygga kräkning och lindra illamående (förutom vid åksjuka).
- För att behandla kräkning, i kombination med andra stödande åtgärder.

Dosering och administrering

1 ml/10 kg sc. eller iv. en gång dagligen i upp till 5 dagar.

För att förebygga kräkning bör Vominil® administreras mer än 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och behandlingen kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning, t.ex. kemoterapi.

Förpackning

1 x 25 ml (Vnr 13 81 12)

Se baksidan för mer information.



Vominil®

maropitant 10 mg/ml
injektionsvätska, lösning

Djurslag

Hund och katt.

Indikationer

Hund: För att behandla och förebygga illamående som orsakas av kemo-terapi. För att förebygga kräkning, förutom då detta orsakas av åksjuka. För att behandla kräkning, i kombination med andra stödjande åtgärder. För att förebygga perioperativt illamående och kräkningar och förbättra återhämtning från generell anestesi efter användning av μ -opioidreceptor-agonisten morfin.

Katt:

För att förebygga kräkning och lindra illamående, förutom då detta orsakas av åksjuka. För att behandla kräkning, i kombination med andra stödjande åtgärder.

Dos och administreringssätt

1 mg/kg (1 ml/10 kg kroppsvikt) sc. eller iv. en gång dagligen i upp till 5 dagar i följd. Intravenös administrering av detta läkemedel bör ges som en bolus utan att blanda läkemedlet med andra vätskor. För att förebygga kräkning ska läkemedlet administreras mer än 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och behandlingen kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning, t.ex. kemoterapi. Eftersom den farmakokinetiska variationen är stor och maropitant ackumuleras i kroppen efter upprepade administreringar en gång om dagen, kan lägre doser än de rekommenderade vara tillräckligt hos vissa individer och vid upprepad dosering.

Överdoser

Övergående reaktioner på injektionsstället vid subkutan injektion.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälp-ämnen.

Biverkningar

Smärta vid injektionsstället, reaktioner av anafylaktisk typ, allergiskt ödem, urtikaria, erytem, kollaps, dyspné, bleka slemhinnor, letargi, neurologiska störningar (t.ex. ataxi, krampfall, muskeltremor).

Interaktioner

Ska inte användas tillsammans med Ca-kanalantagonister, eftersom maropitant har affinitet till Ca-kanaler. Maropitant har hög bindningsgrad till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra, starkt bundna läkemedel.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Kräkning kan bero på allvarliga, svårt försvagande tillstånd, inklusive gastrointestinala blockeringar, och därför bör en korrekt diagnostisk bedömning göras. Enligt god veterinärsed bör antiemetika användas i kombination med annan veterinärbehandling och stödjande åtgärder, såsom dietkontroll och vätsketillförsel, medan de bakomliggande orsakerna till kräkningen utreds. Användning av läkemedlet mot kräkning då detta orsakas av åksjuka rekommenderas inte. Hundar: Även om maropitant har visat sig vara effektivt vid både behandling och förebyggande behandling av kräkning som orsakats av kemoterapi är det mer effektivt om det används i förebyggande syfte. Därför rekommenderas administrering av ett antiemetikum före kemoterapibehandling. Katter: Effekten av maropitant för lindring av illamående har påvisats i studier med hjälp av en modell (xylazin-inducerat illamående). Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Kan orsaka hudirritation. Personer med känd överkänslighet mot maropitant bör administrera läkemedlet med försiktighet. Tvätta exponerad hud omedelbart

efter exponering med rikliga mängder vatten. Uppsök läkare om symtom som t.ex. eksem uppkommer och visa bipacksedeln eller etiketten. Kan vara irriterande för ögonen. Undvik ögonkontakt. Vid oavsiktlig kontakt, skölj ögonen rikligt med färskt vatten. Uppsök läkare om symtom uppkommer. Maropitant är en neurokinin-1 (NK1) receptorantagonist som verkar i centrala nervsystemet. Oavsiktlig självinjektion eller intag kan leda till illamående, yrsel och dåsigheit. Försiktighet bör iakttas för att undvika oavsiktlig självinjektion. Vid oavsiktligt intag eller oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning eftersom inga slutgiltiga reproduktionstoxikologiska studier har utförts på djur.

Hållbarhet

Öppnad: 30 månader. Öppnad: 28 dagar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.

Förpackningsstorlek:: 1 x 25 ml

ATC-kod: QA04AD90.

Innehavare av godkännande för försäljning

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, Lichtenegg, 4600 Wels, Österrike.

Källor::

¹ Tsukamoto et al. (2018): The anti-inflammatory action of maropitant in a mouse model of acute pancreatitis.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.