

Prostata hypertrofi og CPSE

screening, udredning, behandling og monitorering

Alle hanhunde får med tiden forstørret prostata. For at differentiere almindeligt forstørret prostata og klinisk forstørret prostata udføres en måling af CPSE (Canine Specific Esterase)

Screening:

Screening er relevant for:

- *Alle intakte hanhunde over 5-6 år. Man tester for at finde de hunde, som har subklinisk BPH.*
- *Alle intakte hanhunde, som bruges i avl. BPH/prostatitis nedsætter sædkvalitet.*
- *Alle hanhunde med symptomerne blod i urin, uspecifik smerte i bagpart, defækeringsproblemer mm.*
- *Alle hanhunde i behandling (monitorering).*

Testresultat over 70 ng/ml er indikation for forstørret prostata af klinisk relevans. Ved 70 ng/ml er prostataen 1,5 til 2,5 gange forstørret med histopatologiske forandringer.

Forstørret prostata eller symptomer fra prostata uden stigning i CPSE kan være indikativ for cancer eller prostatitis. Vær obs på, at de ofte har BPH samtidig.

Stigning i CPSE sker umiddelbart efter parring. Hunden må derfor ikke have parret indenfor 24 timer.



Kontakt Virbac for det fulde materiale