


Cefabactin

Doserings-skema

Styrker



- ▶ Alle fire styrker i smarttabs, **deles let i to eller fire lige store dele**
- ▶ Godkendt til både hund og kat
- ▶ Høj compliance med **smagskorrigeret tabletter**
- ▶ **Præcis dosering** helt ned til 0,5 kg lgv.



DOSIS GIVES TO GANGE DAGLIG

Kropsvægt	Cefabactin 50 mg	Cefabactin 250 mg	Cefabactin 500 mg	Cefabactin 1000 mg
>0,5 kg - 0,8 kg	◐	-	-	-
>0,8 kg - 1,6 kg	◑	-	-	-
>1,6 kg - 2,5 kg	◒	-	-	-
>2,5 kg - 3,3 kg	⊕	-	-	-
>3,3 kg - 5 kg	⊕ ◐	-	-	-
>5 kg - 6,6 kg	⊕ ⊕	-	-	-
>6,6 kg - 8 kg	⊕ ⊕ ◐ ◐	-	-	-
>8 kg - 10 kg	⊕ ⊕ ⊕	-	-	-
>10 kg - 12,5 kg	-	◐	-	-
>12,5 kg - 16,6 kg	-	⊕	◐	-
>16,6 kg - 20 kg	-	⊕ ◐	-	-
>20 kg - 25 kg	-	⊕ ◐	-	-
>25 kg - 29 kg	-	⊕ ◐	-	-
>29 kg - 33 kg	-	⊕ ⊕	⊕	◐
>31 kg - 41 kg	-	-	⊕ ◐	-
>41 kg - 50 kg	-	-	⊕ ◐	◐
>50 kg - 58 kg	-	-	⊕ ◐	-
>58 kg - 66 kg	-	-	⊕ ⊕	⊕
>66 kg - 83 kg	-	-	-	⊕ ◐

Cefabactin

CEFABACTIN VET. Aktivt stof: Cefalexin.

Lægemiddelform: Tabletter, smarttabs.

Indikation: Behandling af infektion hos hunde og katte forårsaget af bakterier, som er følsomme over for cefalexin, såsom: Luftevejinfektioner, især bronkopneumoni, forårsaget af *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Escherichia coli* og *Klebsiella* spp. Urinvejsinfektioner forårsaget af *Escherichia coli*, *Proteus* spp. og *Staphylococcus* spp. Hudinfektioner hos katte forårsaget af *Staphylococcus* spp. og *Streptococcus* spp. samt hudinfektioner hos hunde forårsaget af *Staphylococcus* spp.

Bivirkninger og risici: Hos katte er let og forbigående opkastning og diarré en meget almindeligt set bivirkning allerede ved det lavest anbefalede dosisregime. Symptomerne var reversible hos de fleste katte uden symptomatisk behandling. Opkastning ses af og til hos hunde, der behandles med produkter, der indeholder cefalexin. Som med andre antibiotika kan der forekomme diarré. I tilfælde af gentagen opkastning og/eller diarré skal behandlingen afbrydes, og man skal søge hjælp hos den behandelende dyrlæge. Der kan opstå sløvhed. I sjældne tilfælde kan der opstå overfølsomhed. Hvis der forekommer overfølsomhedsreaktioner, skal behandlingen afbrydes. I tilfælde af kronisk nyreinsufficiens skal dosis reduceres, eller dosisintervallet skal øges.

Drægtighed og Diegivning: Laboratorieundersøgelser af rotter og mus har ikke afsløret teratogene virkninger. Lægemidlets sikkerhed hos hunde og katte under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

Interaktion med andre lægemidler: For at sikre veterinærlægemidlets effekt bør det ikke anvendes i kombination med bakteriostatiske antibiotika. Samtidig brug af 1. generations- cefalosporiner med aminoglykosidantibiotika eller visse diuretika såsom furosemid kan øge risikoen for nefrotoksicitet.

Dosering: Den anbefalede dosis er 15-30 mg cefalexin pr. kg kropsvægt to gange daglig mindst 5 dage i træk.

Pakningsstørrelser og pris: 50mg 10 stk, 250mg 10stk, 500mg 10 stk og 1000mg 10 stk blisterpakninger.

Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk

Udleveringsgruppe: B.

Indehaver af markedstilladelsen:

Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Holland. Dansk repræsentant: Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 Ulrum.