

Gode råd

- Glemmer du at give en enkelt dosis, sker der ikke så meget ved det. Giv den næste dosis som normalt.
- Tabletterne skal gives ca. på samme tid hver dag.
- Tabletterne optages bedst på tom mave (en time før fodring), men kan godt gives sammen med mad. Det vigtigste er altid at gøre det på samme måde.
- Tabletterne deles nemt ved at lægge dem på en glat overflade og give et let tryk med en finger
- Delte tabletter kan opbevares i blisterpakning i 4 dage.
- Det kan være en god ide af føre dagbog over din hunds symptomer, så du kan se både forbedringer eller forværringer. Dagbogen kan med fordel suppleres med billeder, især med hensyn til hårvækst, skæl og væggtab.



Hundens navn

Dosis

_____ tabletter _____ gange dagligt
 _____ tabletter _____ gange dagligt
 _____ tabletter _____ gange dagligt

Tid for næste kontrol

Stempel

	Wed 01	Thu 02	Fri 03	Sat 04	Sun 05
Tue 07	Wed 08	Thu 09	Fri 10	Sat 11	Sun 12
Tue 14	Wed 15	Thu 16	Fri 17	Sat 18	Sun 19
Tue 21	Wed 22	Thu 23	Fri 24	Sat 25	Sun 26

Et liv med
hypothyreoidisme



VARENr. 9890004208

©Dechra Veterinary Products A/S
Februar 2015


Dechra
Veterinary Products

Forthyron®
LEVOTHYROXIN

For lavt stofskifte – hypothyreoidisme

Din hund har fået stillet diagnosen hypothyreoidisme – det betyder at den ikke producerer tilstrækkeligt med stofskiftehormon.

Hvad kommer sygdommen af?

Den mest almindelige årsag til hypothyreoidisme er en sygdom i immunsystemet som medfører at kroppens immunsystem overreagerer.

Thyreoidia bliver inflammeret som følge af antistoffer målrettet kroppens egne celler. Dette kaldes autoimmun-medieret lymphocytisk thyreoiditis.

Andre årsager til hypothyreoidisme, såsom tumorer i thyreoidea, stråleskader og medfødte forstyrrelser i thyreoidea er sjældne.

Lejlighedsvis kan der opstå en tumor i hypofysen som medfører det vi kalder en sekundær hypothyreoidisme.

Tilstanden er permanent og behandlingen skal fortsætte i hele hundens levetid.

Kan hypothyreoidisme behandles?

Når din hund har fået stillet diagnosen, skal den i gang med behandling med stofskiftehormon. Behandlingen består af tabletter som skal gives 2 gange dagligt. For lav stofskifteproduktion ændrer sig ikke, så derfor skal din hund behandles med stofskiftehormon resten af sin levetid.

Din dyrlæge vil jævnligt udtage blodprøver, for at finde den optimale dosis til netop din hund. Disse blodprøver skal udtages 3 timer efter du har givet din hund Forthyron.

Hvor foregår det?

Stofskiftehormonet bliver produceret i en kirtel der sidder lige foran skjoldbrusken på den øverste del af halsen. Man kan ikke umiddelbart se på kirtlen, at den ikke fungerer, det kræver undersøgelser og blodprøver for at stille diagnosen.

Hvordan kan jeg se, om min hund har for lavt stofskifte?

Det er nødvendigt med undersøgelser hos dyrlægen for at stille diagnosen hypothyreoidisme, men her kan du se nogen af de typiske symptomer ved for lavt stofskifte:

- Sygdommen rammer oftest midaldrende hunde fra 5-9 år.
- Hunden er mindre aktiv og sover meget.
- Tynd, kedelig og skælet pels.
- Hypothyreoidisme kan være underliggende årsag til tilbagevendende hudinfektioner og infektioner i ørerne.
- Hårtab på flanken og brystkassen. Ofte ses symmetrisk hårtab på begge sider.
- Vægtforøgelse, trods uændret fodring.

Hvor hurtigt virker behandlingen?

Allerede få uger efter behandlingen starter vil du mærke, at din hund bliver mere aktiv og energisk. Pelstabet og vægtforøgelsen kræver lidt længere tids behandling.

I tabellen nedenfor kan du se hvordan symptomerne aftager. Allerede efter 13 uger er de fleste hunde symptomfri.

Øget aktivitetsniveau	Typisk indenfor 2 uger
Normalisering af hud og pels	1-4 måneder
Vægttab	Typisk 10% indenfor 3 måneder

Er der nogen bivirkninger ved behandlingen?

Der ses sjældent bivirkninger ved behandlingen, men ved overdosering kan man se symptomer på for højt stofskifte. Det er derfor vigtigt at dyrlægen finder den rette dosis til netop din hund.



		Wed 01	Thu 02
Mon 06	Tue 07	Wed 08	Thu 09
Mon 13	Tue 14	Wed 15	Thu 16