

Separation happens...
Anxiety doesn't have to.

salfarm
www.salfarm.com




Reconcile®
fluoxetin

Reconcile® - Behandling av separationsångest

Vad är **Reconcile®**?

Reconcile® är en "selective serotonin reuptake inhibitor" (SSRI) som blockerar återupptaget av serotonin och därmed ökas nivån av serotonin i synapsen. Serotonin är en neurotransmittor som frigges från den presynaptiska neuronerna och binder till receptorer på den postsynaptiska sidan. Kontroll av ångest är en av serotoninens funktioner och **Reconcile®** kan därför reducera skadligt beteende och göra hunden mer mottaglig för beteendeträning.


- **Endast behandling en gång dagligen**
- **Tabletter med smak för smidig behandling**



Hur effektiv är **Reconcile®**?

Jämförelse av **Reconcile®** och placebo kontrolltabletter: Multicentrisk, doubleblinded studie med 229 hundar i 70 dagar (behandling i 56 dagar med 14 dagars förbehandling). Båda grupperna genomgick beteendeträning. Efter en vecka hade signifikant flera hundar i **Reconcile®**-gruppen förbättringar av deras separationsångest.

*73% av hundarna med separationsrelaterade beteendeproblem visade en märkbar förbättring efter 8 veckor när **Reconcile®** kombinerades med beteendeträning.^{1,2,3}*



Vilka är de potentiella riskfaktorerna?

- Separationsångest är den **näst vanligaste beteendestörningen** hos hund¹
- **14-17% av alla hundar drabbas** av separationsångest^{4,5}
- 40% av hundar på djurhem har **minst ett beteendeproblem**⁶



GENETISK PREDISPOSITION



NY ÄGARE/FAMILJ



FÅ UPPLEVELSER TIDIGT I LIVET



ÅLDERDOM OCH NEDSATT KOGNITION



ÅNGEST VID ANDRA SITUATIONER (T.EX. LJUD)



FÖRÄNDRINGAR I FAMILJEN (T.EX. TILLÖKNING ELLER DÖDSFALL)



FÖRÄNDRINGAR AV ÄGARENS DAGLIGA RUTINER (T.EX. ARBETE)



GENERELL ÅNGEST/NERVOSITET



FLYTTNING



FYSISKA HÄLSOPROBLEM (T.EX. KRONISK SMÄRTA)

Exempel på oönskat beteende hos hundar med separationsångest⁷

Ökad salivproduktion, kräkningar, hyperventilation och ökad hjärtfrekvens



Hur doseras **Reconcile®**?

Reconcile® tuggtabletter ges peroralt i en dos av 1-2 mg/kg. Se vägledande doseringsschema. För att individanpassa dosen kan olika tablettstyrkor kombineras.

Kroppsvikt (kg)	Reconcile® 8 mg tablett per dag	Reconcile® 16 mg tablett per dag	Reconcile® 32 mg tablett per dag	Reconcile® 64 mg tablett per dag
4 - 8	1			
> 8 - 16		1		
> 16 - 32			1	
> 32 - 64				1



Läkemedelsform
Tuggtabletter

Djurslag
Hund

Indikationer

Som hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd hos hund som yttrar sig i form av destruktivt och olämpligt beteende (skällande och okontrollerad defekation/urinering) och enbart i kombination med beteendeförändrande tekniker.

Dosering och administreringssätt

Reconcile® bör administreras peroralt med en dos dagligen på 1 till 2 mg/kg kroppsvikt enligt doseringstabell på framsidan. Om ingen förbättring ses inom 4 veckor bör utredning och uppföljning omvärderas. Reconcile®-tabletter kan ges tillsammans med eller utan foder. Tablettarna är smaksatta och de flesta hundar äter tablettarna när den ges av ägaren. Om en dos glöms bort bör nästa planerade dos administreras enligt ordinationen. Tack vare läkemedlets långa halveringstid är det inte nödvändigt att trappa ned eller minska dosen i slutet av behandlingen.

Överdoser

Vid doser som överskrider den rekommenderade dosen förvärras rapporterade biverkningar. Dessutom observerades aggressivt beteende. I kliniska studier upphörde dessa biverkningar omedelbart efter intravenös tillförsel av en standarddos med diazepam.

Kontraindikationer

Inte till hundar som väger mindre än 4 kg. Inte till hundar med epilepsi eller till hundar med en historik av krampfall. Använd inte vid överkänslighet mot fluoxetin eller andra selektiva serotoninåterupptagshämmare eller mot något hjälpämne.

Biverkningar

Den rekommenderade dosen bör inte överskridas. Minskad aptit (inklusive anorexi) och letargi (mycket vanliga). Urinvägssjukdomar (cystit, urininkontinens, urinretention, stranguri), påverkan på det centrala nervsystemet (okoordinerade rörelser, desorientering). Viktförlust/hedsatt kondition, mydriasis. Flåsning, krampfall, kräkning.

Interaktioner

Bör inte ges samtidigt med läkemedel som sänker anfallströskeln (t.ex. fenotiaziner såsom acepromazin och klorpromazin). Använd inte i samband med andra serotoninmedel (t.ex. sertralin) och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) [t.ex. selegilinhydroklorid, amitraz] eller tricykliska aminer (TCA) (t.ex. amitriptylin och klomipramin). En washout-period på 6 veckor bör användas efter utsättning av behandling med läkemedlet före administrering av ett läkemedel som kan interagera negativt med fluoxetin eller dess metabolit, norfluoxetin. Fluoxetin metaboliseras till stor del av enzymsystemet P-450, även om den exakta isoformen hos hund är okänd. Fluoxetin bör därför användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Säkerheten har inte fastställts hos hundar under 6 månaders ålder eller som väger mindre än 4 kg. Även om det är sällsynt kan krampfall inträffa. Behandling bör avbrytas om krampfall inträffar. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur:** Vid oavsiktlig självmedicinering, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Hos människa omfattar de flesta vanliga symtom som förknippas med överdosering krampfall, sömnlighet, illamående, takykardi och kräkningar.

Dräktighet och laktation

Säkerheten har inte fastställts under dräktighet och laktation och användning rekommenderas därför inte. Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte visat teratogena, fetotoxiska, modertoxiska effekter. Inga effekter på den reproduktiva förmågan hos han- eller honrättor har rapporterats. Använd inte till avelsdjur.

Hållbarhet

Öppnad förpackning: 2 år. Öppnad innerförpackning: 30 dagar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Förvara burken ordentligt försluten för att skydda från fukt. Ta inte ut torkmedlet.

Förpackning

8 mg: 1x30 tuggtabletter
16 mg: 1x30 tuggtabletter
32 mg: 1x30 tuggtabletter
64 mg: 1x30 tuggtabletter

ATC-kod

QN06AB03

Innehavare av godkännande för försäljning

FORTE Healthcare Ltd, Cougar Lane, Naul, Co. Dublin, Ireland

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad. För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån, 254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Källor:

- Simpson BS, Landsberg GM, Reisner IR, et al. Effects of Reconcile (fluoxetine) chewable tablet plus behavior management for canine separation anxiety. Vet Ther. 2007;8(1):18-31.
- Field study T8E420001. Efficacy Evaluation of Fluoxetine (fluoxetine hydrochloride) for the Control of Separation Anxiety in Dogs. Freedom of Information Summary NADA 141-272; Reconcile Fluoxetine Hydrochloride Chewable Tablets: Dogs. 2007: 3.
- Reconcile European Public Assessment Record, accessed October 2021. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/reconcile-epar-scientific-discussion_en.pdf
- Bamberger M, Houpt KA. Signalment factors, comorbidity, and trends in behavior diagnoses in dogs: 1,644 cases (1991-2001). JAVMA. 2006;229(10):1593.
- Tiira K, Sulkama S, Lohi H. Prevalence, comorbidity, and behavioral variation in canine anxiety. J Vet Behav. 2016;16:38.
- Salman MoD, Hutchison J, Ruch-Gallie R, et al. Behavioral reasons for relinquishment of dogs and cats to 12 shelters. J Appl Anim Welfare Sci. 2000;3(2):95.
- Schwartz S. Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2003;22(11):1526-1532.