


Der er ingen tid at spille ved utilsigtet væggtab



Informationsbrochure til dyreejeren

Mirataz[®]



Opnå bedre kontrol med Mirataz



Et utilsigtet vægttab skal altid tages alvorligt.

En ændring i din katts kropsvægt kan have flere forskellige årsager, og det er ikke altid lige let at identificere, hvad vægtændringen skyldes. Det kan være det første symptom på sygdom, såsom en overaktiv skjoldbruskkirtel, kronisk nyresygdom eller inflammatorisk tarmsygdom.

Længerevarende utilstrækkelig ernæring kan være mere skadelig for din kat end den underliggende årsag til kattens vægttab.


Du kan hjælpe med at identificere tidlige tegn på vægttab derhjemme.

Hold øje med kattens spisevaner:

- ▶ Har katten den samme interesse for mad, som den plejer at have.
- ▶ Spiser katten den korrekte mængde mad.
- ▶ Hvor lang tid tager det for katten at spise op.

Når du kæler og aer din kat, skal du lægge mærke til forandringer i kattens kropbygning:

- ▶ Om ribbenene tydeligere kan mærkes, eller rygknoglerne er mere fremtrædende.
- ▶ Buler eller hævelser.
- ▶ Områder, der virker ømme.



Dechra introducerer Mirataz


Mirataz er det første godkendte veterinærlægemiddel til at forhindre væggtab hos katte.

Mens du og din praktiserende dyrlæge samarbejder om at finde den underlæggende årsag til kattens væggtab, hjælper Mirataz katten med at genvinde appetitten. Du vil bemærke en forbedring inden for 14 dage.

Instruktioner for brug af Mirataz

- ▶ Brug altid engangshandsker, og vask hænderne grundigt efter hver påføring.
- ▶ Opbevar altid tuben i den børnesikrede emballage mellem påføringerne.
- ▶ Mirataz påføres på indersiden af kattens ydre øre; hver anden dag i venstre øre og hver anden dag i højre øre.
- ▶ Efter påføring, skal du sørge for, at både mennesker og dyr, der er i kontakt med katten, ikke rører ved kattens øre i de første 12 timer efter påføringen. Mirataz kan både optages gennem munden og gennem huden.
- ▶ Katten bør ikke sove sammen med ejeren under hele behandlingen.
- ▶ Det kan være lettere at påføre Mirataz om morgenen, inden du tager på arbejde, eller om aftenen inden du går i seng.
- ▶ Hvis du glemmer en dosis, skal du påføre dosen den næste dag, som du plejer.
- ▶ Hold øje med, hvor meget katten spiser, når du stopper med at bruge Mirataz, og observér hvis den spiser mindre. Hvis kattens appetit fortsat er nedsat efter 48 timer, skal du kontakte din praktiserende dyrlæge.

Mirataz er en salve, som påføres på indersiden af kattens ydre øre, og som optages gennem huden.





Behandlingsdagbog

Mirataz påføres på den indvendige side af kattens ydre øre: hver anden dag i venstre øre og hver anden dag i højre øre. Brug skemaet herunder til at holde styr på hvilket øre, der senest er anvendt til påføring af lægemidlet.

Bedøm kattens appetit ved hjælp af stjernerne:

1 stjerne = vil slet ikke spise, 5 stjerner = normal appetit.


Uge 1	Venstre øre	Højre øre	Appetit				
Mandag	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Tirsdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Onsdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Torsdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Fredag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Lørdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Søndag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★

Uge 2	Venstre øre	Højre øre	Appetit				
Mandag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Tirsdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Onsdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Torsdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Fredag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Lørdag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★
Søndag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★	★	★	★	★



Hvis du er bekymret for din katts helbred under behandlingen med Mirataz, skal du kontakte din praktiserende dyrlæge.



Hvordan påføres Mirataz?



- Åbn emballagen i enden.
- Tryk begge faner ind (1) på samme tid, og træk i fanen i enden (2) for at blottlægge den indre emballage.
- Sørg for at lægge tuben med Mirataz tilbage i emballagen efter hver brug.
- Sørg for, at emballagens låsefunktion er genetableret.
- Sørg for, at lægemidlet opbevares utilgængeligt for børn.



Trin 1:

Tag vandtætte handsker på.

Trin 2:

Drej hæften mod uret for at åbne tuben.

Trin 3:

Tryk jævnt, men forsigtigt, på tuben, så der kommer 3,8 cm salve ud på din pegefinger; brug målestregen på emballagen eller i indlægssedlen til at måle.

Trin 4:

Brug fingeren til forsigtigt at gnubbe salven ind på den indvendige side af kattens ydre øre, idet salven fordeles jævnt på overfladen. Hvis salven kommer i kontakt med din hud, skal huden vaskes med vand og sæbe.

Linjen nedenfor svarer til den streg salve, der skal påføres:

For at se en instruktionsvideo til Mirataz, scanne QR-koden.



Mirataz 20 mg/g transdermal salve. **Aktivt stof:** Mirtazapin 2mg. **Rx. ATCvet-kod:** QN06AX11.

Dyrearter: Katte. **Indikationer:** Til forøgelse af kropsvægten hos katte, der lider af ringe appetit og vægttab som følge af kroniske sygdomme. **Kontraindikationer:** Bør ikke anvendes til dyr, der er under 7,5 måneder gamle, eller som vejer under 2 kg, eller til katte, der behandles med cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidasehæmmere (MAOI'er), eller som har været behandlet med en MAOI inden for de seneste 14 dage før behandling med dette veterinærlægemiddel, da der kan være en øget risiko for serotonin syndrom.

Særlige forsigtighedsregler for dyret: Virkningen af veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte under 3 år. Virkningen og sikkerheden ved veterinærlægemidlet er ikke klarlagt hos katte med svær nyresygdom og/eller neoplasi. Behandlingen med mirtazapin bør ikke erstatte nødvendig diagnosticering og/eller behandlingsregimer, som er påkrævet for at behandle den eller de underliggende sygdomme, der forårsager det uønskede vægttab. Veterinærlægemidlet bør ikke anvendes på beskadiget hud. I tilfælde af leversygdom kan der forekomme forhøjede leverenzymmer. Nyresygdom kan medføre reduceret clearance af mirtazapin, hvilket kan medføre højere eksponering for lægemidlet. Virkningen af mirtazapin på regulering af blodsukkeret er ikke undersøgt. Ved brug hos katte med nedsat blodvolumen bør understøttende behandling (væsketerapi) iværksættes. Der bør udvises forsigtighed, så andre dyr i husholdningen ikke kommer i kontakt med påføringsstedet, før det er tørt.

Særlige forsigtighedsregler for personer: Produktet kan absorberes kutant eller oralt og kan forårsage sløvhed eller sedation. Undgå kontakt med det behandlede dyr i de første 12 timer efter den daglige påføring, og indtil påføringsstedet er tørt. Det anbefales derfor at behandle dyret om aftenen. Vandtætte beskyttelseshandsker til engangsbrug skal anvendes ved håndtering og påføring af veterinærlægemidlet. Vask hænderne grundigt umiddelbart efter påføring af veterinærlægemidlet eller i tilfælde af, at huden kommer i kontakt med produktet eller den behandlede kat. Da gravide kvinder anses som en mere følsom population, anbefales gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, at undgå håndtering af produktet og at undgå kontakt med behandlede dyr i hele behandlingsperioden. Efterlad ikke tuben udenfor den børnesikrede beholder, bortset fra ved påføring. Børn må ikke være til stede, når produktet smøres på katten.

Bivirkninger: Reaktionen på påføringsstedet (erytem, skorpedannelse, rester, afskalning/tørhed, flagedannelse, rysten på hovedet, dermatitis eller irritation, hårtab og kløe) og adfærd ændringer (øget vokalisering, hyperaktivitet, desorientering eller ataksi, letargi/svagthed, opmærksomhedssøgende og aggressiv adfærd) var meget almindelige i sikkerhedsstudier og kliniske studier. Opkastning, polyuri forbundet med reduceret vægtfyldte i urin, forhøjet karbamid og dehydrering var almindeligt forekommende i sikkerhedsstudier og kliniske studier. Afhængigt af sværhedsgraden af opkastning, dehydrering eller adfærdsmæssige ændringer kan anvendelsen af produktet seponeres efter dyrlægens vurdering af benefit/risk-forholdet. Disse bivirkninger, inkl. lokale reaktioner, forsvandt ved slutningen af behandlingsperioden uden specifik behandling.

Drægtighed eller diegivning: Bør ikke anvendes til katte, der skal bruges til avl, er drægtige eller diegivende. **Interaktion med andre lægemidler og andre former:** Bør ikke anvendes til katte, der behandles med cyproheptadin, tramadol eller monoaminoxidasehæmmere (MAOI'er), eller som har været behandlet med en MAOI inden for de seneste 14 dage før behandling med dette veterinærlægemiddel, da der kan være en øget risiko for serotonin syndrom. Mirtazapin kan øge de sedative egenskaber ved benzodiazepiner og andre stoffer med sedative egenskaber. **Dosering og indgivelsesmåde:** Transdermal anvendelse. Veterinærlægemidlet påføres topisk på den indvendige side af det ydre øre én gang dagligt i 14 dage med en dosis på 0,1 g salve/kat (2 mg mirtazapin/kat). Det svarer til en streg salve på 3,8 cm. Skift hver dag mellem højre og venstre øre. Den indvendige side af kattens øre kan eventuelt rengøres med en tør serviet eller klud umiddelbart før den næste planlagte dosis. Hvis du glemmer at give en dosis, skal du vente til næste dag med at genoptage den daglige dosering. Den anbefalede faste dosis er testet hos katte med en vægt på mellem 2,1 kg og 7,0 kg. De kendte symptomer på en overdosis mirtazapin på > 2,5 mg/kg hos katte omfatter: vokalisering og adfærd ændringer, opkastning, koordinationsbesvær, rastløshed og rysten. I tilfælde af en overdosis bør symptomatisk/understøttende behandling om nødvendigt iværksættes. I tilfælde af en overdosis er der observeret samme bivirkninger som ved den anbefalede terapeutiske dosis, men med en højere forekomst.

Pakningsstørrelser: Aluminiumstube på 5 g i en plastbeholder med en børnesikret hætte. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Regulatory B.V.

Repræsentant: Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 10.12.2019. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produkt egenskaber. For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.**