

Promased

acepromazin 35 mg/ml
oral gel



Egenskaper

Promased verkar centralt psykomotoriskt, vilket inducerar sedering och reducerar motorisk aktivitet. Behandlade djur upplever försvagning av muskler men medvetandet är inte särskilt begränsat.

Samtidig medicinering med centrala och perifera smärtstillande medel (barbiturater, morfinderivat, lokala bedövningsmedel) ökar effekten av acepromazin och kan leda till neuroleptanalgesi.

Promased förhindrar genom de hämmande effekterna på det autonoma nervsystemet kräkningar och kan användas som ett antiemetikum.

Djurslag

Häst och hund.

Indikationer

För sedering och premedicinering inför anestesi.

Dosering och administrering

Gelen appliceras i hästens kind eller längst bak på hundens tunga. Efter applicering lyft upp djurets huvud omedelbart i några sekunder och se till att djuret har svält dosen.

Se doseringsscheman på baksidan.

Karenstid

Häst: Använd ej till hästar vars kött, slaktbiprodukter och mjölk är avsedda för humankonsumtion.

Förpackning

1 x 1 ml (Vnr. 14 90 26)

1 x 10 ml (Vnr. 19 11 60)

Se baksidan för mer information.



Promased

acepromazin 35 mg/ml
oral gel

Djurslag

Häst och hund.

Indikationer

För sedering och premedicinering inför anestesi.

Dos och administreringsätt

Se scheman. För att säkerställa en exakt dos bör valet av spruta anpassas till djurets kroppsvikt. Ta bort locket från sprutan, placera den i djurets mun och applicera gelen i hästens kind eller längst bak på hundens tunga. Efter applicering lyft upp djurets huvud omedelbart i några sekunder och se till att djuret har svält dosen. Doseringsinformationen ovan fungerar som riktlinje och bör anpassas till varje patient med hänsyn till de olika faktorer (t.ex. temperament, ras, nervositet etc.) som kan påverka känsligheten för lugnande medel. För att säkerställa doseringens noggrannhet ska kroppsvikten bestämmas före doseringen.

10 ml spruta: Dosen bestäms genom att den räfflade ringen placeras vid lämplig markering på sprutan. Flytta den räfflade doseringsringen på sprutan så att ringens nederkant är i linje med markeringen för önskad dos. Dosen av gelen kan justeras i steg om 0,5 ml.

1 ml spruta: Sprutor som innehåller 1 ml gel möjliggör dosering särskilt för små hundraser. Gelen är fylld i en förseglingsbar spruta och dosen kan justeras i steg om 0,05 ml.

Överdoserig

Tidigare insättande av sederingsymptom och en förlängd effekt. Ataxi, hypotoni, hypotermi och effekter på CNS. Noradrenalin, men inte adrenalin, kan användas för att motverka kardiovaskulära effekter.

Kontraindikationer

Hypotoni, posttraumatisk stress, hypovolemi, djur i ett uppjagat tillstånd, hypotermi, blod-/koaguleringsjukdomar, anemi, hjärt- eller lungsvikt, epilepsi, nyfödda djur, hundar yngre än 3 månader, överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Biverkningar

Häst: Tillfällig blodtrycksfall, hämrad temperaturreglering. Tillfällig minskning av antalet erythrocyter och hemoglobinkoncentrationen samt tillfällig minskning av antalet trombocyter och leukocyter. Kan öka utsöndringen av prolaktin och leda till fertilitetsstörningar. Penisframfall. En återgång av penisen måste vara synbar inom två till tre timmar. Om så inte sker bör veterinär kontaktas. Har orsakat parafimos, i vissa fall till följd av priapism. Motstridiga kliniska tecken på aggressivitet och allmän stimulering av det centrala nervsystemet kan förekomma. Prolaps av blinkmembran.

Hund:

Hypotoni, takykardi, ökad andningsfrekvens, arytmi, mios, lakrimation och ataxi. Motstridiga kliniska tecken på aggressivitet och allmän stimulering av det centrala nervsystemet kan förekomma. Prolaps av blinkmembran.

Interaktioner

Förstärker effekten av centralt dämpande läkemedel. Samtidig administrering med organiska estrar av fosforsyra (antiparasitära medel såsom klorfenvinfos, diklorvos etc) eller prokainhydroklorid bör undvikas. Verkar dämpande på det sympatiska nervsystemet och samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel ska undvikas. Oral administrering av antacida kan leda till en minskad gastrointestinal absorption av acepromazin. Opiater och adrenalin kan förstärka de blodtryckssänkande effekterna.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Effekten efter oral administrering uppkommer efter 30–60 minuter hos större djur och efter 15–25 minuter hos mindre djur. Verknings tiden är i genomsnitt 4 timmar, dock beroende på sederingsdjupet och djurets individuella svar. Att öka den rekommenderade dosen leder till en längre verknings tid och att biverkningarna varar längre, men inte till en högre grad av sedering. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Kan orsaka sedering. Undvik oavsiktligt intag. För att undvika att oavsiktligt intag av läkemedlet görs av ett barn, sätt tillbaka locket omedelbart efter användning och förvara den öppnade sprutan i originalförpackningen när den inte används. För att säkerställa korrekt stängning måste du höra ett "klick" när det gäller 10 ml-förpackningen. För 1 ml-förpackningen, skruva fast locket noggrant. Förvara alltid förpackningen utom syn- och räckhåll för barn. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. FRAMFÖR INGET FORDON. Kan orsaka allergiska reaktioner och kan vara svagt irriterande för ögon och hud. Personer som är överkänsliga mot acepromazin eller andra fentiaziner eller någon av hjälpämnen ska undvika kontakt med läkemedlet. Personer med känslig hud eller som är i kontinuerlig kontakt med läkemedlet bör bära ogenomträngliga handskar. Undvik kontakt med ögonen eller slemhinnor. Vid kontakt med ögon eller slemhinna, skölj försiktigt i rinnande vatten i 15 minuter. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händer och exponerad hud noga efter användning.

Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd endast enligt nytta/riskbedömning. Se även avsnitt Biverkningar om fertilitetsstörningar hos ston.

Karenstider

Häst: Använd ej till hästar vars kött, slaktbiprodukter och mjölk är avsedda för human konsumtion. Behandlingen måste registreras i hästens pass.

Hållbarhet

Öppnad: 2 år
Öppnad: 3 månader

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara den förfyllda orala sprutan väl tillsluten. Skyddas mot frost.

Förpackningsstorlek:: 1x1 ml, 1x10 ml.

ATC-kod: QN05AA04

Innehavare av godkännande för försäljning

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tjeckiet.

Häst - 10 ml förfylld oral spruta

Mängd produkt	Kroppsvikt häst			
	175 kg	350 kg	525 kg	700 kg
Lätt sedering (0,1-0,2 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	0,5-1,0 ml	1,0-2,0 ml	1,5-3,0 ml	2,0-4,0 ml
Djupare sedering (0,3-0,4 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	1,5-2,0 ml	3,0-4,0 ml	4,5-6,0 ml	6,0-8,0 ml

Häst - 1 ml förfylld oral spruta

Mängd produkt	Kroppsvikt häst			
	100 kg	125 kg	150 kg	175 kg
Lätt sedering (0,1-0,2 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	0,30-0,60 ml	0,35-0,70 ml	0,40-0,85 ml	0,50-1,00 ml

Hund - 10 ml förfylld oral spruta

Mängd produkt	Kroppsvikt hund			
	17,5 kg	35 kg	52,5 kg	70 kg
Lätt sedering (1,0 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	0,5 ml	1,0 ml	1,5 ml	2,0 ml
Djupare sedering (2,0 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	1,0 ml	2,0 ml	3,0 ml	4,0 ml
Premedicinering inför anestesi (3,0 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 ml	6,0 ml

Hund - 1 ml förfylld oral spruta

Mängd produkt	Kroppsvikt hund							
	5 kg	10 kg	15 kg	17,5 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg
Lätt sedering (1,0 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	0,15 ml	0,30 ml	0,45 ml	0,50 ml	0,60 ml	0,75 ml	0,90 ml	1,0 ml
Djupare sedering (2,0 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	0,3 ml	0,6 ml	0,9 ml	1,0 ml	-	-	-	-
Premedicinering inför anestesi (3,0 mg acepromazin/kg kroppsvikt)	0,45 ml	0,9 ml	-	-	-	-	-	-

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.