

Rococlos vet.

Rotavirus suis, Escherichia coli,
Clostridium perfringens
injeksjonsvæske, emulsjon



Egenskaper

Rococlos vet. er en inaktivert vaksine som stimulerer dannelsen av nøytraliserende antistoffer mot svinerotavirus og fimbriale antistoffer mot *E. coli*, samt antistoffer mot *Clostridium perfringens*.

Rococlos vet. inneholder inaktivert svinerotavirus type A, *E. coli* og *Clostridium perfringens* type C.

Rococlos vet. brukes til passiv immunisering av nyfødte smågriser ved aktiv immunisering av drektige ungpurker og purker for å redusere kliniske tegn på sykdom forårsaket av svinerotavirus, *E. coli* og *Clostridium perfringens*.

Dyrearter

Gris (drektige ungpurker og purker).

Indikasjoner

Til passiv immunisering av nyfødte smågriser ved aktiv immunisering av drektige ungpurker og purker for å redusere:

- Kliniske tegn (neonatal diaré) og dødelighet forårsaket av *E. coli*-stammer som uttrykker fimbrie-adhesinene F4ac, F5, F6 og F41.
- Kliniske tegn (neonatal diaré, oppkast og anoreksi) forårsaket av svinerotavirus type A.
- Kliniske tegn (neonatal diaré, enteritt) og dødelighet forårsaket av beta-toksin (uttrykt av *Clostridium perfringens*).

Dosering og tilførselsvei

2 ml gis i.m. i nakkemuskulene bak øret.

Immunitet

Passiv immunitet starter med at smågriser dier og er avhengig av at smågrisene får tilstrekkelig med råmelk og melk fra vaksinerte mødre etter fødselen.

Beskyttelse av smågriser for indikasjonene ovenfor ble demonstrert for:

- *E. coli*-stammer: innen 12 timer etter fødselen.
- Rotavirus type A: ved 5 dagers alder.
- *Clostridium perfringens*, type C, beta-toksin: ved 2 dagers alder.

Vaksinasjonsprogram

Drektige ungpurker og purker

Grunnvaksinasjon – 2 administrasjoner av én dose med intervall på 2 uker:

- første administrasjon 4 uker før forventet fødsel
- andre administrasjon 2 uker før forventet fødsel

Revaksinasjon:

- under påfølgende drektigheter: administrasjon av 1 dose 2 uker før forventet fødsel

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Pakningsstørrelse

1 x 50 ml (Vnr 57 18 48)

Se baksiden for mer informasjon



salfarm
www.salfarm.com

Rococlos vet.

Rotavirus suis, Escherichia coli, Clostridium perfringens
injeksjonsvæske, emulsjon

Dyrearter

Gris (drektige ungpurker og purker).

Indikasjoner

Til passiv immunisering av nyfødte smågriser ved aktiv immunisering av drektige ungpurker og purker for å redusere:

- Kliniske tegn (neonatal diaré) og dødelighet forårsaket av *E. coli*-stammer som uttrykker fimbrie-adhesinene F4ac, F5, F6 og F41
- Kliniske tegn (neonatal diaré, oppkast og anoreksi) forårsaket av svinerotavirus
- Kliniske tegn (neonatal diaré, enteritt) og dødelighet forårsaket av beta-toksin (uttrykt av *Clostridium perfringens*).

Immunitet er vist fra:

Passiv immunitet starter med at smågriser dier og er avhengig av at smågrisene får tilstrekkelig med råmelk og melk fra vaksinerte mødre etter fødselen.

Beskyttelse av smågriser for indikasjonene ovenfor ble demonstrert for: *E. coli*-stammer: innen 12 timer etter fødselen.

- Rotavirus: ved 5 dagers alder.
- Clostridium perfringens*, type C, beta-toksin: ved 2 dagers alder.

Varighet av immunitet: Demonstrert på basis av utfordringsstudier: 3 ukers alder.

Dosering og tilførselsvei

Vaksinedose: 2 ml

Administrasjonsvei: Intramuskulær bruk

Bruk i nakkemusklene bak øret (paraurikulært område).

La vaksinen varme opp til ca. 15-25 °C før bruk og rist innholdet godt før administrasjon. Bruk sterile injeksjonsnåler og sprøyter og administrer vaksinen til et område som er aseptisk behandlet med ren og tørr hud.

Drektige ungpurker og purker

Grunnvaksinasjon – 2 administrasjoner av én dose med intervall på 2 uker:

- første administrasjon 4 uker før forventet fødsel
- andre administrasjon 2 uker før forventet fødsel

Revaksinasjon

- under påfølgende drektigheter: administrasjon av 1 dose 2 uker før forventet fødsel

Overdosering/Forgiftning

Ikke relevant.

Kontraindikasjoner

Ingen.

Bivirkninger

Svært vanlige (> 1 dyr / 10 behandlede dyr):	Økning i kroppstemperatur ¹
Vanlige (1 til 10 dyr / 100 behandlede dyr):	Hevelse på injeksjonsstedet ²

¹ Mild økning i kroppstemperatur (maksimal økning observert hos individuelle dyr på 0,7 °C, med en maksimal varighet på 4 dager etter vaksinasjon).

² Mild hevelse med maksimal diameter på 10 mm, som vedvarer i maksimalt 3 dager etter vaksinasjon.

Interaksjoner

Ingen informasjon er tilgjengelig om sikkerhet og effekt av denne vaksinen ved bruk sammen med andre preparater. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Spesielle advarsler og særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr: Ikke relevant.

Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ikke relevant.

Drektighet/Laktasjon

Skal brukes under drektighet.

Tilbakeholdelsestider

0 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2 °C – 8 °C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Pakningsstørrelse: 1x50 ml

Reseptgruppe: C

ATCvet-nr.: QI09A L09

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tsjekkia.

Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra: Salfarm Scandinavia AS, Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til preparatomtalen godkjent av Legemiddelverket.