

Promased

acepromazin 35 mg/ml
oralgel



Egenskaper

Promased virker sentralt på de psykomotoriske sentrene, og induserer derved sedasjon og reduserer motorisk aktivitet. Behandlede dyr opplever svekkelse av muskler, men bevissthetsen er ikke vesentlig begrenset.

Samtidig administrering av sentrale og perifere analgetika (barbiturater, morfinderivater, lokalanestetika) øker effekten av acepromazin og kan føre til neuroleptanalgesi.

Promased kan brukes som et antiemetikum, da den dempende effekten på det autonome nervesystemet forhindrer mulig oppkast under anestesi.

Promased gir beroligende effekt etter 15-25 minutter hos små dyr og 30-60 minutter hos store dyr. Maksimal plasmakonsentrasjon oppnås samtidig med selve sedasjonen, det vil si på 15-30 minutter. Effekthvarigheten, avhengig av administrert dose, er 4 timer i gjennomsnitt.

Dyrearter

Hest og hund.

Indikasjoner

Til sedasjon og premedikasjon ved anestesi.

Dosering og tilførselsvei:

Valget av sprøyte tilpasses dyrets kroppsvekt for mest mulig nøyaktig dosering. Sprøyt ut gelen inn mot hestens kinnpose eller bakerst på tungen hos hunder og løft straks dyrets hode noen få sekunder og forsikre deg om at dyret har svelget dosen.

Tilbakeholdelsestider

Hest: ikke godkjent til hest hvis kjøtt, innmat og melk er tiltenkt konsum. Behandlingen skal registreres i hestens pass.

Pakningsstørrelse

1 x 1 ml (Vnr 14 90 26)

1 x 10 ml (Vnr 19 11 60)

Se baksiden for mer informasjon



Promased

acepromazin 35 mg/ml
oralgel

Dyrearter

Hest og hund.

Indikasjoner

Til sedasjon og premedikasjon ved anestesi.

Dosering og tilførselsvei

Se skjemaer. Valget av sprøyte tilpasses dyrets kroppsvekt for mest mulig nøyaktig dosering. Sprøyt ut gelen inn mot hestens kinnpose eller bakerst på tungen hos hunder og løft straks dyrets hode noen få sekunder og forsikre deg om at dyret har svelget dosen. For premedisinering gjelder samme doser som for sedasjon. Etter administrering av acepromazin er mengden anestesimiddel nødvendig for å indusere anestesi betydelig redusert. Doseringsinformasjon er gitt som en retningslinje og bør tilpasses hver pasient, med hensyn til de ulike faktorene (f.eks. temperament, rase, nervøsitet osv.) som kan påvirke følsomheten for beroligende midler. Hos hingster er det laveste doseområdet indisert for å minimere risikoen for penisprolaps.

10 ml sprøyte: Dosen bestemmes ved å sette ringen på det aktuelle stempelmerket. Flytt den rillede doseringsringen på stempelet slik at den nedre kanten av ringen er på linje med merket for ønsket dose. Dosen gel kan justeres til 0,5 ml.

1 ml sprøyte: tillater dosering spesielt for små hunderaser. Dosen gel kan justeres til 0,05 ml.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering resulterer i en tidligere inntreden av sedative symptomer og forlenget effekt. Toksiske effekter er ataksi, hypotensjon, hypotermi og ekstrapyramidale effekter. Noradrenalin, men ikke adrenalin, kan brukes til å motvirke de kardiovaskulære effektene.

Kontraindikasjoner

Tilfeller av hypotensjon, posttraumatisk sjokk eller hypovolemi, alvorlig emosjonell eksitasjon, hypotermi, hematologiske forstyrrelser/koagulopatier, anemi, hjerte- eller lungesvikt, epilepsi, nyfødt, hunder under 3 måneder gamle, overfølsomhet for virkestoffet/hjelpstoffene.

Bivirkninger

Hest:

Forbigående fall i blodtrykk kan forekomme. Hemming av temperaturregulering. Forbigående reduksjon i erytrocyttantall og hemoglobinkonsentrasjon, samt i antall trombocytter og leukocytter. Acepromazin kan øke prolaktinsekresjonen, og føre til fertilitetsforstyrrelser. Penisprolaps kan forekomme. Retraksjon av penis må være synlig innen to til tre timer. Hvis dette ikke inntreffer anbefales det å kontakte veterinær. Administrering av acepromazin har noen ganger forårsaket parafimose etter priapisme. Motstridende kliniske tegn på aggresjon og generalisert CNS-stimulering kan forekomme. Prolaps av blinkhinnen.

Hund:

Hypotensjon, takykardi, økt respirasjonsfrekvens, arytmi, miøse, tåreflom og ataksi. Motstridende kliniske tegn på aggresjon og generalisert CNS-stimulering kan forekomme. Prolaps av blinkhinnen (tredje øyelokk).

Interaksjoner

Acepromazin forsterker virkningen av sentraldeprimerende legemidler. Unngå samtidig administrering med organiske estere av fosforsyre. Ikke gi samtidig behandling med blodtrykksnedsenke preparater. Antacider kan føre til redusert GI absorpsjonen av acepromazin. Opiater og adrenalin kan forsterke de hypotensive effektene av acepromazin.

Spesielle advarsler og særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr:

Brukes med forsiktighet og med redusert dose ved tilfeller av leversykdom eller til svekkede dyr. Smertefulle aktiviteter skal unngås når sederte dyr håndteres, med mindre de samtidig er behandlet med smertestillende. Etter administrering skal dyrene holdes på et rolig sted og sensoriske stimuli bør unngås. Hest: Under sedasjon er hester følsomme for vanlige auditive og visuelle stimuli, derfor kan støyende og raske bevegelser forårsake oppvåkning fra sedasjonstilstanden. Etter administrering skal hester ikke brukes i jobb på 36 timer. Hos hingster er det laveste doseområdet indisert for å minimere risikoen for penisprolaps. Bruk til hester under 100 kg bør baseres på en nøye nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. For konkurranse- og løpshester skal det tas spesielle forholdsregler, for å sikre overholdelse av konkurranse-reglene. I tilsvilfeller er det tilrådelig å analysere urinen. Metabolitter kan påvises som forbudte stoffer. Hund: Hos hunder med MDR1 mutasjon, har acepromazin en tendens til å forårsake en dypere og forlenget sedasjon. Hos disse hundene bør dosen reduseres med 25 % - 50 %. Hos noen hunder, spesielt boxere og andre kortsnutede raser, kan spontan besvimelse eller synkope forekomme, så det er tilrådelig å bruke en lav dose. Hos store hunderaser bør den minste mulige dosen benyttes. Acepromazin bør brukes med varsomhet som et dempende middel til aggressive hunder, da det kan gjøre dyret mer tilbøyelig til å bli skremt og reagere på lyder eller annet sensorisk stimuli. Bruk til hunder under 17,5 kg skal baseres på en grundig nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Acepromazin forårsaker sedasjon. Unngå utilsiktet inntak. For å unngå at et barn svelger noe utilsiktet, sett hetten på plass umiddelbart etter bruk og oppbevar den åpnede sprøyten utilgjengelig i den lukkede originale ytterpakningen. Ved utilsiktet inntak, søk lege omgående og vis pakningsvedlegg/etikett, men IKKE KJØR da sedasjon og endringer i blodtrykket kan forekomme. Kan forårsake allergiske reaksjoner og kan være lett irriterende for øyne og hud. Personer med kjent overfølsomhet overfor acepromazin eller andre fenotiaziner eller overfor noen av hjelpestoffene bør unngå kontakt. Personer med sensitiv hud eller som er i hyppig kontakt med preparatet anbefales å bruke ugjennomtrengelige hansker. Unngå utilsiktet kontakt med øyne og slimhinner. Ved utilsiktet kontakt med øyne eller slimhinner, skyll det berørte området med rennende vann i 15 minutter. Ved vedvarende irritasjon oppsøk lege og vis pakningsvedlegg/etikett. Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk.

Drekthighet/Laktasjon

Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke studert hos målatene.

Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Tilbakeholdelsestider

Hest: ikke godkjent til hest hvis kjøtt, innmat og melk er tiltenkt konsum. Behandlingen skal registreres i hestens pass.

Oppbevaring og holdbarhet

Hold den ferdigfylte oralsprøyten tett lukket. Beskyttes mot frost. Holdbarhet i uåpnet salgspakning: 2 år, etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder

Pakningsstørrelse: 1 x 1 ml, 1 x 10 ml.

Reseptgruppe: AC

ATCvet-nr.: Antipsykotikum, sedativum. QN05A A04 (acepromazin)

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tjekkiet.

Hest - 10 ml ferdigfylt oral sprøyte

Menge preparat	Hestens vekt			
	175 kg	350 kg	525 kg	700 kg
For mild sedasjon (0,1-0,2 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,5-1,0 ml	1,0-2,0 ml	1,5-3,0 ml	2,0-4,0 ml
For moderat sedasjon (0,3-0,4 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	1,5-2,0 ml	3,0-4,0 ml	4,5-6,0 ml	6,0-8,0 ml

Hest - 1 ml ferdigfylt oral sprøyte

Menge preparat	Hestens vekt			
	100 kg	125 kg	150 kg	175 kg
For mild sedasjon (0,1-0,2 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,30-0,60 ml	0,35-0,70 ml	0,40-0,85 ml	0,50-1,00 ml

Hund - 10 ml ferdigfylt oral sprøyte

Menge preparat	Hundens vekt			
	17,5 kg	35 kg	52,5 kg	70 kg
For mild sedasjon (1,0 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,5 ml	1,0 ml	1,5 ml	2,0 ml
For moderat sedasjon (2,0 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	1,0 ml	2,0 ml	3,0 ml	4,0 ml
For premedikasjon til anestesi (3,0 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 ml	6,0 ml

Hund - 1 ml ferdigfylt oral sprøyte

Menge preparat	Hundens vekt	5 kg	10 kg	15 kg	17,5 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg
For mild sedasjon (1,0 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,15 ml	0,30 ml	0,45 ml	0,50 ml	0,60 ml	0,75 ml	0,90 ml	1,0 ml	
For moderat sedasjon (2,0 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,3 ml	0,6 ml	0,9 ml	1,0 ml	-	-	-	-	
For premedikasjon til anestesi (3,0 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,45 ml	0,9 ml	-	-	-	-	-	-	

Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra:

Salfarm Scandinavia AS, Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til preparatomtalen godkjent av Legemiddelverket.