

Promased®

acepromazin 35 mg/ml
oralgel



Gel til sedasjon og premedikasjon av hest og hund

- Gel til oral bruk
- Premedikasjon og sedasjon
- Sprøyter i to størrelser - lett å tilpasse dose
- Doseavhengig effekt



1 ml sprøyte til
mindre hunder!

salfarm
www.salfarm.com



Promased gir beroligende effekt etter 15-25 minutter hos hund.

Den sedative effekten varer i gjennomsnitt i 4 timer, men vil avhenge av den administrerte dosen.

Dosen kan justeres etter ønsket og forventet effekt.

Hund - 10 ml ferdigfylt oral sprøyte

Mengde preparat \ Hundens vekt	17,5 kg	35 kg	52,5 kg	70 kg
For mild sedasjon (1,0 mg acepromazin/kg)	0,5 ml	1,0 ml	1,5 ml	2,0 ml
For moderat sedasjon (2,0 mg acepromazin/kg)	1,0 ml	2,0 ml	3,0 ml	4,0 ml
For premedikasjon til anestesi (3,0 mg acepromazin/kg)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 ml	6,0 ml

Hund - 1 ml ferdigfylt oral sprøyte

Mengde preparat \ Hundens vekt	5 kg	10 kg	15 kg	17,5 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg
For mild sedasjon (1,0 mg acepromazin/kg)	0,15 ml	0,30 ml	0,45 ml	0,50 ml	0,60 ml	0,75 ml	0,90 ml	1,0 ml
For moderat sedasjon (2,0 mg acepromazin/kg)	0,3 ml	0,6 ml	0,9 ml	1,0 ml	-	-	-	-
For premedikasjon til anestesi (3,0 mg acepromazin/kg)	0,45 ml	0,9 ml	-	-	-	-	-	-

Hund: Hos hunder med MDR1 mutasjon bør dosen reduseres med 25 % - 50 %. Hos noen hunder, spesielt boxere og andre kortsnutede rase er det tilrådelig å bruke en lav dose. Hos store hunderaser bør den minste mulige dosen benyttes. Vis varsomhet ved bruk til aggressive hunder, da acepromazin kan gjøre dyret mer tilbøyelig til å bli skremt og reagere på lyder eller annen sensorisk stimuli. Bruk til hunder under 17,5 kg skal baseres på en grundig nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.



Promased gir beroligende effekt etter 30-60 minutter hos hest.

Effekten varer i 4-6 timer.

Dosen kan justeres etter ønsket og forventet effekt.

Hest - 10 ml ferdigfylt oral sprøyte

Mengde preparat \ Hestens vekt	175 kg	350 kg	525 kg	700 kg
For mild sedasjon (0,1-0,2 mg acepromazin/kg)	0,5-1,0 ml	1,0-2,0 ml	1,5-3,0 ml	2,0-4,0 ml
For moderat sedasjon (0,3-0,4 mg acepromazin/kg)	1,5-2,0 ml	3,0-4,0 ml	4,5-6,0 ml	6,0-8,0 ml

Hest - 1 ml ferdigfylt oral sprøyte

Mengde preparat \ Hestens vekt	100 kg	125 kg	150 kg	175 kg
For mild sedasjon (0,1-0,2 mg acepromazin/kg kroppsvekt)	0,30-0,60 ml	0,35-0,70 ml	0,40-0,85 ml	0,50-1,00 ml

Hest: Hos hingster er det laveste doseområdet indisert for å minimere risikoen for penisprolaps.

Doseringsinformasjonen over er en anbefaling og bør tilpasses den enkelte pasient. Det bør tas hensyn til ulike faktorer (f.eks. temperament, rase, stress etc.) som kan påvirke følsomheten for sedativer.

Dyrearter: Hest og hund. **Indikasjoner:** Til sedasjon og premedikasjon ved anestesi. **Dosering og tilførselsvei:** Se skjemaer. Valget av sprøyte tilpasses dyrets kroppsvekt for mest mulig nøyaktig dosering. Sprøyt ut gelen inn mot hestens kinnpose eller bakerst på tungen hos hunder og løft straks dyrets hode noen få sekunder og forsikre deg om at dyret har svelget dosen. For premedisinering gjelder samme doser som for sedasjon. Etter administrering av acepromazin er mengden anestesimiddel nødvendig for å indusere anestesi betydelig redusert. Doseringinformasjonen er gitt som en retningslinje og bør tilpasses hver pasient, med hensyn til de ulike faktorene (f.eks. temperament, rase, nervøsitet osv.) som kan påvirke følsomheten for beroligende midler. Hos hingster er det laveste doseområdet indisert for å minimere risikoen for penisprolaps. **10 ml sprøyte:** Dosen bestemmes ved å sette ringen på det aktuelle stempelet. Flytt den rillede doseringsringen på stempelet slik at den nedre kanten av ringen er på linje med merket for ønsket dose. Dosen gel kan justeres til 0,5 ml. **1 ml sprøyte:** tillater dosering spesielt for små hunderaser. Dosen gel kan justeres til 0,05 ml. **Overdosering/forgiftning:** Overdosering resulterer i en tidligere inntreden av sedative symptomer og forlenget effekt. Toksiske effekter er ataksi, hypotensjon, hypotermi og ekstrapyramidale effekter. Noradrenalin, men ikke adrenalin, kan brukes til å motvirke de kardiovaskulære effektene. **Kontraindikasjoner:** Tilfeller av hypotensjon, posttraumatisk sjokk eller hypovolemi, alvorlig emosjonell eksitasjon, hypotermi, hematologiske forstyrrelser/koagulopati, anemi, hjerte- eller lungesvikt, epilepsi, nyfødt, hunder under 3 måneder gamle, overfølsomhet for virkestoffet/hjelpstoffene. **Bivirkninger:** Hest: Forbigående fall i blodtrykk kan forekomme. Hemming av temperaturregulering. Forbigående reduksjon i erytrocyttantall og hemoglobinkonsentrasjon, samt i antall trombocyter og leukocyter. Acepromazin kan øke prolaktinsekresjonen, og føre til fertilitetsforstyrrelser. Penisprolaps kan forekomme. Retraksjon av penis må være synlig innen to til tre timer. Hvis dette ikke inntreffer anbefales det å kontakte veterinær. Administrering av acepromazin har noen ganger forårsaket parafimose etter priapisme. Motstridende kliniske tegn på aggresjon og generalisert CNS-stimulering kan forekomme. Prolaps av blinikhinnen. **Hund:** Hypotensjon, takykardi, økt respirasjonsfrekvens, arytmi, miøse, tåreflom og ataksi. Motstridende kliniske tegn på aggresjon og generalisert CNS-stimulering kan forekomme. Prolaps av blinikhinnen (tredje øyelokk). **Interaksjoner:** Acepromazin forsterker virkningen av sentraldeprimerende legemidler. Unngå samtidig administrering med organiske estere av fosforsyre. Ikke gi samtidig behandling med blodtrykksnedsenkende preparater. Antacider kan føre til redusert GI absorpsjonen av acepromazin. Opiater og adrenalin kan forsterke de hypotensive effektene av acepromazin. **Spesielle advarsler og særlige forholdsregler:** Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr: Brukes med forsiktighet og med redusert dose ved tilfeller av leversykdom eller til svekkede dyr. Smertefulle aktiviteter skal unngås når sederte dyr håndteres, med mindre de samtidig er behandlet med smertestillende. Etter administrering skal dyrene holdes på et rolig sted og sensoriske stimuli bør unngås. **Hest:** Under sedasjon er hester følsomme for vanlige auditive og visuelle stimuli, derfor kan støyende og raske bevegelser forårsake oppvåkning fra sedasjonsstilstanden. Etter administrering skal hester ikke brukes i jobb på 36 timer. Hos hingster er det laveste doseområdet indisert for å minimere risikoen for penisprolaps. Bruk til hester under 100 kg bør baseres på en nøyte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. For konkurranse- og løpshester skal det tas spesielle forholdsregler for å sikre overholdelse av konkurransereglene. I tilsvilfeller er det tilrådelig å analysere urinen. Metabolitter kan påvises som forbudte stoffer. **Hund:** Hos hunder med MDR1 mutasjon, har acepromazin en tendens til å forårsake en dyper og forlenget sedasjon. Hos disse hundene bør dosen reduseres med 25 % - 50 %. Hos noen hunder, spesielt boxere og andre kortsnutede raser, kan spontan beviselse eller synkope forekomme, så det er tilrådelig å bruke en lav dose. Hos store hunderaser bør den minste mulige dosen benyttes. Acepromazin bør brukes med varsomhet som et dempende middel til aggressive hunder, da det kan gjøre dyret mer tilbøyelig til å bli skremt og reagere på lyder eller annet sensorisk stimuli. Bruk til hunder under 17,5 kg skal baseres på en grundig nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. **Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet:** Acepromazin forårsaker sedasjon. Unngå utilsiktet inntak. For å unngå at et barn svelger noe utilsiktet, sett hetten på plass umiddelbart etter bruk og oppbevar den åpnede sprøyten utilgjengelig i den lukkede originale ytterpakningen. Ved utilsiktet inntak, søk lege omgående og vis pakningsvedlegg/etikett, men IKKE KJØR da sedasjon og endringer i blodtrykket kan forekomme. Kan forårsake allergiske reaksjoner og kan være lett irriterende for øyne og hud. Personer med kjent overfølsomhet overfor acepromazin eller andre fenotiaziner eller overfor noen av hjelpestoffene bør unngå kontakt. Personer med sensitiv hud eller som er i hyppig kontakt med preparatet anbefales å bruke uigjennomtrengelige hansker. Unngå utilsiktet kontakt med øyne og slimhinner. Ved utilsiktet kontakt med øyne eller slimhinner, skyll det berørte området med rennende vann i 15 minutter. Ved vedvarende irritasjon oppsøk lege og vis pakningsvedlegg/etikett. Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. **Drekthet/Laktasjon:** Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og gjevning er ikke studert hos målartene. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær. **Tilbakeholdelsestider:** Hest: Ikke godkjent til hest hvis kjøtt, innmat og melk er tiltenkt konsum. Behandlingen skal registreres i hestens pass. **Oppbevaring og holdbarhet:** Hold den ferdigfylte oralsprøyten tett lukket. Beskyttes mot frost Holdbarhet i uåpnet salgspakning: 2 år, etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder **Pakningsstørrelse:** 1 x 1 ml, 1 x 10 ml. **Reseptgruppe:** AC ATCvet-nr.: Antipsykotikum, sedativum. QN05A A04 (acepromazin) **Indehaver av markedsføringstilladelsen:** Bioveta, a.s., Komenškého 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tjekkiet.

Teksten er forkortet i forhold til preparatomtalen godkjent av Direktoratet for medisinske produkter. Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra: Salfarm Scandinavia AS, Jordtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo. Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com, website: www.salfarm.com