

Catophos Vet

butafosfan 100 mg/ml

cyanokobalamin (B12-vitamin) 0,05 mg/ml

injeksjonsvæske, oppløsning



Egenskaper

Butafosfan er en organisk fosforkilde som blant annet er relevant for dyrs energimetabolisme. Det er essensielt for glukoneogenesen.

Cyanokobalamin (vitamin B12) er et koenzym i biosyntesen av glukose fra propionat. I tillegg fungerer det som en kofaktor for enzymer, noe som er viktig for fettisyntesen, samt for å opprettholde normal hematopoiese, beskytte leveren, bevare muskelvev, sunn hud, hjerne og pankreasmetabolisme.

Kombinasjonen av cyanokobalamin og butafosfan har i kliniske studier vist ulike effekter på fettmetabolismen hos storfe.

Dyrearter

Storfe, hest og hund.

Indikasjoner

Som støttende behandling ved metabolske eller reproduksjonsrelaterte lidelser når tilførsel av fosfor og cyanokobalamin er nødvendig.

Støtte til muskelfunksjon ved mangel på fosfor og/eller cyanokobalamin.

Dosering og tilførselsvei:

Art	Dose buta- fosfan (mg/kg)	Dose cyanoko- balamin (mg/kg)	Dosevolum for preparatet	Administra- sjonsvei
Storfe	5–10	0,0025–0,005	5–10 ml / 100 kg	i.v.
Hest				
Hund	10–15	0,005–0,0075	0,1–0,15 ml/kg	i.v., i.m., s.c.

Administrasjon

Storfe og hest: Kun til intravenøs bruk.

Hund: Til intravenøs, intramuskulær eller subkutan bruk.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 0 dager

Melk: 0 timer

Pakningsstørrelse

1 x 100 ml (Vnr 46 56 61)

Se baksiden for mer informasjon.



salfarm
www.salfarm.com

*Vær oppmerksom på at gjeldene preparatomtale kun er for storfe, hest og hund.

Catophos Vet

cyanokobalamin (B12-vitamin) 0,05 mg/ml
injeksjonsvæske, oppløsning

Indikasjoner

Storfe, hest, hund.

Indikasjoner

Alle målarter:

- Støttebehandling og forebygging av hypofosfatemi og/eller mangel på cyanokobalamin (vitamin B12).

Storfe:

- Støttebehandling for å gjenopprette drøvtygging etter kirurgisk behandling av forskjøvet løypemage forbundet med sekundær ketose.
- Komplementær behandling for melkefeber som tillegg til Ca/Mg-behandling.
- Forebygging av utvikling av ketose, dersom det administreres før kalving.

Hest:

- Tilleggsbehandling hos hester som lider av muskelutmattelse.

Dosering

Storfe, hest: til intravenøs bruk.

Hund: til intravenøs, intramuskulær og subkutan bruk.

Art	Dose buta- fosfan (mg/kg)	Dose cyanokob- alamin (mg/kg)	Dosevolum for preparatet	Administra- sjonsvei
Storfe	5–10	0,0025–0,005	5–10 ml / 100 kg	i.v.
Hest				
Hund	10–15	0,005–0,0075	0,1–0,15 ml/kg	i.v., i.m., s.c.

For støttebehandling av sekundær ketose hos kuer, bør anbefalt dose administreres på tre etterfølgende dager. For forebygging av ketose hos kuer, bør anbefalt dose administreres på tre etterfølgende dager innenfor 10-dagers perioden før forventet kalving. For andre indikasjoner, skal behandling gjentas etter behov.

Proppen kan trygt punkteres opptil 40 ganger. Om behov for mer - bruk en optrekkskanyle.

Overdosering/Forgiftning

Ingen kjente.

Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene.

Bivirkninger

Sjeldne: smerte på injeksjonsstedet. Svært sjeldne: sirkulatorisk sjokk.

Interaksjoner

Ingen kjente.

Forsiktighetsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr: i.v. administrasjon skal gjøres veldig sakte da tilfeller av sirkulatorisk sjokk kan være forbundet med for hurtig injeksjon. Hos hunder som lider av kronisk nyresvikt skal preparatet kun brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Catophos Vet inneholder benzyalkohol som kan forårsake hypersensitivitetsreaksjoner (allergi). Personer med kjent hypersensitivitet overfor benzyalkohol bør unngå kontakt. Dette preparatet kan forårsake irritasjon av hud, øyne og slimhinner. Slik kontakt med preparatet bør unngås. Ved utilsiktet eksponering, skyll det affiserte området grundig med vann. Ikke spis, drikk eller røyk når du håndterer dette preparatet. Vask hendene etter bruk.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og diegiving hos kuer. Veterinærpreparatets sikkerhet ved bruk under drektighet og diegiving er ikke klarlagt hos hoppe og tisper. Laboratoriestudier i rotter har ikke vist tegn på teratogene, føtotoxiske eller maternotoksiske effekter. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Tilbakeholdelsestider

Storfe, hest: slakt 0 døgn, melk 0 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet for preparatet i uåpnet salgspakning: 3 år.
Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Pakningsstørrelse: 1x100ml hetteglass.

Reseptgruppe: C

ATCvet-nr.: QA12CX99

Indehaver af markedsføringstilladelsen

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ytterligere opplysninger finnes i preparatomtalen som kan ses på www.felleskatalogen.no eller rekvireres fra:
Salfarm Scandinavia AS, Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Tlf. 902 97 102, E-mail: norge@salfarm.com

Teksten er forkortet i forhold til preparatomtalen godkjent av Legemiddelverket.